

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: BLACK PEARL PASTA

Termék típusa(i): 14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2013-MA-14-00060-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0002669-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	7
5.1. Használati utasítások	7
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	7
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	7
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	8
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	8
6. Egyéb információk	8

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Black Pearl egérirtó pép
Flash egérirtó pép
Racan AF egérirtó pép

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	LODI S.A.S.
	Cím	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Franciaország
Engedélyszám	HU-2013-MA-14-00060-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0002669-0000	
Az engedélyezés dátuma	19/03/2013	
Az engedély lejáratának dátuma	01/10/2023	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	Société CGB Compagnie Générale des Biocides
A gyártó címe	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray Franciaország
Gyártási helyek	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray Franciaország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag

3 - Alfaklórálóz

A gyártó neve

LODI SAS

A gyártó címe

Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray Franciaország

Gyártási helyek

HIKAL Ltd. T-21. MIDC Industrial Area Taloja Raigad district 410208 Maharashtra India

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Alfaklórálóz	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-a-D-glucofuranose	Hatóanyag	15879-93-3	240-016-7	4

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Gyermekektől elzárva tartandó.

A élelmiszerből, italtól és takarmánytól távol tartandó -nak/-nek megfelelően tárolandó.

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírások szerint.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - lakossági felhasználók részére

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek előfordulása észlelhető.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Mus musculus</i> Közhasználatú név: Házi egér Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek Tudományos név: <i>Mus musculus</i> Közhasználatú név: Házi egér Fejlődési szakasz: Fiatal egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Zárt térben, egérintásra
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kihelyezhető mérgezett csalétek Részletes leírás: -
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): 100 A kezelések száma és időzítése: kismértékű egérártalomnál: 5 méterenként 1 doboz (5-20 gramm pép); nagy mértékű egérártalomnál: 3 méterenként 1 doboz (5-20 gramm pép)
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Felhasználásra kész, 5 vagy 10 grammos, egyedileg filterpapír tasakokba csomagolt pép Előre feltöltött műanyag (PS vagy PP) egéretető dobozban: 5, 10 vagy 2 x 10 g töltőtömeggel Kartonpapír dobozban, műanyag (PE vagy PP) zacskóba csomagolva: 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480, 520, 560 g, 1 és 1,5 kg össztömeggel Fém dobozban, műanyag (PP) zacskóba csomagolva: 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480, 520, 560 g, 1 és 1,5 kg össztömeggel Fém dobozban: 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480, 520, 560 g, 1 és 1,5 kg össztömeggel Műanyag (PP) vödörben: 500 g, 1 és 1,5 kg össztömeggel Kartonpapír dobozban két előre feltöltött műanyag egéretető állomás PS - polisztirol, PP - polipropilén, PE - polietilén

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A műanyag egéretető dobozt tartalmazó kiserelések külső csomagolásán feltüntetendő:

- A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálóártalom irtószer alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékű egérártalom felszámolására).
- Az egerek jelenlétére jellegzetes nyomaikból (fészkek, lyukak, vonulási utak, ürülék stb.) vagy a rágásuk okozta károkból következtethetünk. A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
- Vegyük számításba, hogy amennyiben az egerek az érintett hellyel szomszédos épületekben is jelen vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a területekre is kiterjed.
- A bőrrel való érintkezés kerülendő (lehetőség szerint viseljen védőkesztyűt).
- A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint minden, az egerek számára elérhető táplálékforrást távolítsunk el.
- Az egéretető dobozt ne nyissuk fel. A szerelvényt a megfigyelt rágcsálóaktivitás közvetlen közelében – elsősorban a falak mentén, szekrények alatt és a bútorok mögött – helyezzük ki, úgy, hogy a hosszanti oldala a fallal érintkezzen, és nyílásai a falhoz essenek közelebb.
- Az etetőhelyeket első alkalommal 1-3 nap múlva, ezt követően pedig hetente ellenőrizzük, az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A szennyezett vagy penészes csalétket cseréljük ki. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálók ártalma teljesen meg nem szűnik.
- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.
- Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de az egerek továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova.
- Az egerek elpusztulása a fogyasztást követően 24 óra múlva várható.
- A csalétket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.
- A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől függően, 7-14 napot vehet igénybe. Amennyiben a rágcsálóártalom 14 nap alatt nem csökken, forduljunk kártevőirtó szakemberhez.
- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtjük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

A műanyag egéretető dobozt nem tartalmazó kiserelések külső csomagolásán feltüntetendő:

- A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálóártalom irtószer alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékű egérártalom felszámolására).
- Az egerek jelenlétére jellegzetes nyomaikból (fészkek, lyukak, vonulási utak, ürülék stb.) vagy a rágásuk okozta károkból következtethetünk. A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
- Vegyük számításba, hogy amennyiben az egerek az érintett hellyel szomszédos épületekben is jelen vannak, a kezelés csak akkor lesz hatásos, ha azokra a területekre is kiterjed.
- A bőrrel való érintkezés kerülendő (lehetőség szerint viseljen védőkesztyűt).
- A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint minden, az egerek számára elérhető táplálékforrást távolítsunk el.
- Elsősorban a falak mentén, a szekrények alatt, a bútorok mögött alakítsunk ki ún. etetőhelyeket, amelyekből a rágcsálók elhullásukhoz elegendő mennyiségű irtószert tudnak fogyasztani.
- Lehetőség szerint használjunk olyan műanyag rágcsálóetető állomást, amellyel biztosítható, hogy a gyermekek, valamint a nem célszervezet állatok (az egyéb vadon élő állatok, illetve a házi- és haszonállatok) ne férhessenek hozzá a csalétekhez.
- A rágcsálóirtó pépet tartalmazó tasakokat -azok felnyitása nélkül- rögzítsük az etetőállomásban található rúd vagy túske segítségével és gondoskodjunk az állomás stabil rögzítéséről is.
- Ennek hiányában a készítményt rakjuk papír vagy műanyag tálcákra, majd ezeket a falak mentén helyezzük ki, végül borítsunk rájuk egy-egy tetőcserepet vagy más alkalmas fedőlapot úgy, hogy az egerek a csalétket megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, valamint a nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá. Az egériirtó pépet tartalmazó tasakokat drót segítségével rögzíthetjük is, hogy azokat a rágcsálók ne hurcolják el.

• Az etetőhelyekre írjuk rá: „Vigyázat! Rágcsálóirtó szert tartalmaz!” • Az etetőhelyeket első alkalommal 1-3 nap múlva, ezt követően pedig hetente ellenőrizzük, az elfogyasztott csalétket pótoljuk. A szennyezett vagy penészes csalétket cseréljük ki. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálók ártalma teljesen meg nem szűnik. • Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.
--

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. Az elhullott rágcsáló tetemét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla zacskóban levő tetemet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - foglalkozásszerű felhasználók részére

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek előfordulása észlelhető.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: <i>Mus musculus</i> Közhasználatú név: Házi egér Fejlődési szakasz: Ivarérett egyedek Tudományos név: <i>Mus musculus</i> Közhasználatú név: Házi egér Fejlődési szakasz: Fiatal egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Zárt térben, egérintásra

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: Kihelyezhető mérgezett csalétek
Részletes leírás:
-

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: -
Hígítás (%): 100
A kezelések száma és időzítése:
kismértékű egérártalomnál: 5 méterenként 1 doboz (5-20 gramm pép);
nagyértékű egérártalomnál: 3 méterenként 1 doboz (5-20 gramm pép)

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Felhasználásra kész 5, vagy 10 grammos egyedileg filterpapír tasakokba kiszerelt pép.
Előre feltöltött műanyag (PS vagy PP) egéretető dobozban: 5, 10 vagy 20 g töltőtömeggel
Műanyag (PP) vödörben: 1; 2,5 és 5 kg összötömeggel
Kartonpapír dobozban, műanyag (PE vagy PP) zacskóba csomagolva: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 és 20 kg összötömeggel
PP - polipropilén; PS - polisztirol; PE - polietilén

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek előfordulása észlelhető
A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.
A termék használata közben javasolt védőkesztyűt viselni.
Az egérintő pépet az erre a célra szolgáló szerelvényben helyezzük az egerek által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltételezett búvóhelyük közelébe. Gondoskodjunk az etetőállomások stabil rögzítéséről.
Az egéretető dobozt, illetve a pépet tartalmazó tasakokat ne nyissuk fel!
Ügyeljünk arra, hogy a dobozt gyermekek és nem célszervezet állatok (egyéb vadon élő állatok, illetve házi- és haszonállatok) által hozzá nem férhető, esőtől védett helyre tegyük.
A rágcsálóirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket – a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően – feltűnő jelzéssel kell ellátni és azokon fel kell tüntetni: a rágcsálóirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét, valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát.
Az etetőhelyeket első alkalommal 1-3 nap múlva, ezt követően pedig hetente ellenőrizzük, a kiürült rágcsálóirtó dobozokat cseréljük le. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjük meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálók ártalma teljesen meg nem szűnik
Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett dobozok mennyiségét viszont ne növeljük.
Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de az egerek továbbra is jelen vannak, helyezzük át az irtószert máshova.
Az egerek elpusztulása a fogyasztást követően 24 óra múlva várható.
A csalétek csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.
Indokolatlanul ne használjuk a csalétek folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kívánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPC) egyidejű bevezetésével összekötni.
A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 7-14 nap alatt teljes rágcsálómentesség érhető el. Amennyiben a rágcsálók ártalma ezt követően is tapasztalható, a kezelést egy eltérő (pl. véralvadást gátló) hatóanyagú rágcsálóirtó szerrel folytassuk.
A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.
Rezisztenciakezelés
A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében törekedjünk az eltérő hatásmechanizmusú vegyületet tartalmazó formulációk váltakozó alkalmazására.
Alkalmazzunk integrált kártevőirtási rendszert, melynek a megelőzés, valamint a vegyi módszerek mellett a fizikai módszerek alkalmazása is részét képezi.
A készítmény hatásosságát a felhasználás során figyelemmel kell követni és az esetleges hatáscsökkenés okait fel kell tárni.
Ne alkalmazzuk a terméket olyan esetekben, ahol a hatóanyaggal szembeni rezisztencia gyaníthatóan vagy bizonyítottan fennáll.

Célszerű értesíteni a forgalmazót, amennyiben a termék alkalmazása nem bizonyult hatékonynak, illetve ha rezisztencia jeleit tapasztaljuk.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcscsálók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcscsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

-

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Kizárólag egérirtásra és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!
Tilos a készítményt nem célszervezet állatok elpusztítására használni.
Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni, hogy a csalétekhez sem a gyermekek, sem a nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá.
A csalétket tilos élelmiszerrel, állati takarmánnyal érintkezésbe kerülő felületeken alkalmazni! Munka közben tilos enni,inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.
Beszennyezett,romlott rágcscsálóirtó szert ne használjon fel.
Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó.
A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. Ne juttassa a készítményt élővízbe.
Az egérirtó pép keserű ízanyagot tartalmaz, amely segít megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:

- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, illetve címkéjét.
- Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
- A lenyelt termék mennyiségétől függetlenül, ne egyen és ne igyon semmit.
- A mérgezettet stabil oldalfekvésbe kell helyezni és védeni kell a hirtelen mozdulatok vagy görcsroham esetén bekövetkező a sérülésektől.
- A mérgezett személy légzését megfigyelés alatt kell tartani.

Bőrré jutáskor:

- Távolítsa el a szennyezett ruházatot.
- A bőrt bő, szappanos vízzel mossa le.
- Ne használjon oldószert, illetve higítószert.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő (lehetőség szerint langyos) vízzel, óvatosan öblítse ki.
- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem öblítését.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:

A készítmény központi idegrendszeri depresszánt, valamint görcskiváltó hatóanyagot, alfaklóralózt tartalmaz. A rágcsálóirtó szer – lenyelését követően – narkózist, csökkent reakciókészséget, testhőmérséklet-csökkenést, szívritmus-zavarokat, görcsrohamot, nehézlégzést okozhat. A hörgőelzáródás korán bekövetkezik.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés után az etetőhelyeket szüntessük meg. Gyűjtsük össze a megmaradt irtószert, valamint a rágcsálóirtó szerelvényeket és családtekállomásokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott irtószert feltakarításáról. Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejét az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

6. Egyéb információk

A címkefelirat tartalmazza:

Black Pearl egérirtó pép, Flash egérirtó pép vagy Racan AF egérirtó pép*

Hatóanyaga: 4% alfaklóralóz

Engedélyes: LODI S.A.S. (Parc d'Activités des Quatre Routes, F-35390 Grand Fougeray, Franciaország)

Gyártja: Société CGB – Compagnie Générale des Biocides, Parc d'Activités des Quatre Routes, F-35390 Grand Fougeray, Franciaország

Engedélyszám: HU-2013-MA-14-00060-0000

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai, a csomagolás jellegének függvényében:

lakossági felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4.1. (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 4.1.1., 4.1.4., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5.

foglalkozásszerű felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4.2. (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 4.2.1., 4.2.4., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5.

A műanyag egérirtó dobozokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Black Pearl egérirtó pép, Flash egérirtó pép vagy Racan AF egérirtó pép*

Hatóanyaga: 4% alfaklóralóz

Engedélyes: LODI S.A.S. (Franciaország)

Gyártja: Société CGB (Franciaország)

Engedélyszám: HU-2013-MA-14-00060-0000

Továbbá az 5 és 10 grammos filterpapír tasakokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Black Pearl egérirtó pép, Flash egérirtó pép vagy Racan AF egérirtó pép*

Hatóanyaga: 4% alfaklóralóz

*A csomagoláson csak az adott termék kereskedelmi nevét szükséges feltüntetni.