

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Escatop rágcsálótó szer

Termék típusa(i): 14. terméktípus - Rágcsálótó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálótó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálótó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2015-MA-14-000125-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0009221-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	4
4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	5
4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések	5
4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	5
4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	5
4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	7
4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	7
4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések	8
4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	8
4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	8
4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	10
4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	10
4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések	10
4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	11
4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	11
5. Általános használati utasítás	11
5.1. Használati utasítások	11

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	12
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	12
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	13
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	13
6. Egyéb információk	13

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Escatop rágcsálótírtó szer

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
	Cím	via Desman, 43 35010 Borgoricco Olaszország
Engedélyszám	HU-2015-MA-14-000125-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0009221-0000	
Az engedélyezés dátuma	25/07/2014	
Az engedély lejáratának dátuma	31/08/2020	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	VEBI Istituto Biochimico s.r.l.
A gyártó címe	Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Olaszország
Gyártási helyek	VEBI Istituto Biochimico s.r.l. 35010 Borgoricco (PD) Olaszország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	12 - Bromadiolon
A gyártó neve	ACTIVA SRL
A gyártó címe	Via Feltre 32 20132 Milán Olaszország
Gyártási helyek	Tezza S.r.l-via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Olaszország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Bromadiolon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Hatóanyag	28772-56-7	249-205-9	0,005

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok

Károsíthatja a születendő gyermeket.

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (vér) károsítja a szerveket .

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.

Védőkesztyű használata kötelező.

Expozíció vagy annak gyanúja esetén:Orvosi ellátást kell kérni.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően.

A por belélegzése tilos.

Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - házi egerek és patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – beltéri

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus-Házi egér-Fiatal és ivarérett egyedek Rattus norvegicus-Vándorpatkány-Fiatal és ivarérett egyedek Rattus rattus-házi patkány-Fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Csalétek formulációk: - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek - Fedett és védett csali pontok egészen addig, amíg azok ugyanolyan védelmet biztosítanak a nem célfajok és emberek számára mint a zárható etető dobozok. - felhasználásra kész csalétek közvetlen alkalmazása üregben
A felhasználás mértéke és gyakorisága	patkányok - Nagy fertőzöttség: 100 g csalétek csalétekállomásonként. - Alacsony fertőzöttség: 60 g csalétek csalétekállomásonként. házi egerek 40 g csalétek csalétekállomásonként. - - 0 - patkányok - Nagy fertőzöttség: 100 g csalétek csalétekállomásonként - Alacsony fertőzöttség: 60 g csalétek csalétekállomásonként. házi egerek - Nagy fertőzöttség: 40 g csalétek csalétekállomásonként - Alacsony fertőzöttség: 20 g csalétek csalétekállomásonként.

Felhasználói kör

Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

A csomag mérete legalább 1,5 kg-tól 25 kg-i.

A termék a csomagoláson belül lédig vagy 10-30g tasakban található.

Csomagoló tasak anyaga:

- műanyag réteggel bevont papír
- műanyag kompozit

Ahol alkalmazható A csomagban a tasakokat külön kell csomagolni, és a tasak mérete legfeljebb 10 kg lehet.

Csomagolóanyag:

- boríték, műanyag: koextrudált/HDPE/polietilén
- boríték, műanyag: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- boríték, műanyag: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- fémdoboz, papír, karton, doboz, papír, karton borítékkal, benne extrudált/HDPE/polietilén
- vödör: HDPE
- palack :HDPE

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A kezelési időszak után távolítsuk el a megmaradó terméket.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Lédig szemes termék áthelyezéskor viseljünk megfelelő légzésvédelmi felszerelést(eldobható légzésvédelmi maszk EN149 FFP2).Ne érjen a termékhez pusztán kézzel,viseljen megfelelő védőkesztyűt.
- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassuk az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének használóit) a rágcsálóirtásról
- vegyük fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.
- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban keressük meg és távolítsuk el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
- A termék használata csak olyan tartós kezelés alatt álló területeken ajánlott, ahol magas az újrafertőződés esélye vagy ahol más módszerek sikertelennek bizonyultak.

- Folyamatosan ne használjunk véralvadást gátló rágcsálóirtó csalétket a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha a csalétekállomásokat vízelvezető rendszerek közelébe helyezzük el, biztosítsuk, hogy a csalétket ne érje víz.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Szavatossági idő: 24 hónap

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - egerek és patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – kültéren épületek körül

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus-Házi egér-Fiatal és ivarérett egyedek Rattus norvegicus-vándorpatkány-Fiatal és ivarérett egyedek Rattus rattus-Házi patkány-Fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Kültéri Kültéren épületek körül
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Csalétek formulációk: - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek - Fedett és védett csali pontok egészen addig, amíg azok ugyanolyan védelmet biztosítanak a nem célfajok és emberek számára mint a zárható etető dobozok. -felhasználásra kész csalétek közvetlen alkalmazása üregben
A felhasználás mértéke és gyakorisága	patkányok - Nagy fertőzöttség: 100 g csalétek csalétekállomásonként. - Alacsony fertőzöttség: 60 g csalétek csalétekállomásonként. házi egerek 40 g csalétek csalétekállomásonként. - 0 - patkányok - agy fertőzöttség: 100 g csalétek csalétekállomásonként. - Alacsony fertőzöttség: 60 g csalétek csalétekállomásonként. házi egerek - Nagy fertőzöttség: 40 g csalétek csalétekállomásonként. - Alacsony fertőzöttség: 20 g csalétek csalétekállomásonként.

Felhasználói kör

Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

A csomag mérete legalább 1,5 kg-tól 25 kg-i.

A termék a csomagoláson belül lédig vagy 10-30g tasakban található.

Csomagoló tasak anyaga:

- műanyag réteggel bevont papír
- műanyag kompozit

Ahol alkalmazható A csomagban a tasakokat külön kell csomagolni, és a tasak mérete legfeljebb 10 kg lehet.Csomagolóanyag:

- boríték, műanyag: koextrudált/HDPE/polietilén
- boríték, műanyag: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- boríték, műanyag: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- fémdoboz, papír, karton, doboz, papír, karton borítékkal, benne extrudált/HDPE/poletilén
- vödör: HDPE
- palack :HDPE

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- védjük a csalétket az időjárás viszontagságaitól, a csalétekállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezük ki.
- cseréljük ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.
- A kezelési időszak végén távolítsuk el a megmaradó terméket.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Lédig szemes termék áthelyezéskor viseljük megfelelő légzésvédelmi felszerelést(eldobható légzésvédelmi maszk EN149 FFP2).Ne érjen a termékhez puszta kézzel,viseljen megfelelő védőkesztyűt.

- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassuk az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének használóit) a rágcsálóirtásról
- vegyük fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.
- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsuk el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
- A termék használata csak olyan tartós kezelés alatt álló területeken ajánlott, ahol magas az újrafertőződés esélye vagy ahol más módszerek sikertelennek bizonyultak.

- Folyamatosan ne használjunk véralvadástgátló rágcsálóirtó csalétket a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsáló aktivitás kimutatására.
- Ne alkalmazzuk a terméket pulzáló kezelésre.

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárkok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelébe helyezzük el, biztosítsuk, hogy a csalétket ne érje víz.

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Szavatossági idő: 24 hónap

4.3 A felhasználás leírása

Felhasználás 3 - patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – kültéri nyílt területeken és hulladéklerakókban

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Rattus norvegicus-Vándorpatkány-Fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Kültéri Kültéri nyílt területek Kültéri hulladéklerakók
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Csalétek formulációk: - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállományban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek - Fedett és védett csali pontok egészen addig, amíg azok ugyanolyan védelmet biztosítanak a nem célfajok és emberek számára mint a zárható etető dobozok. - felhasználásra kész csalétek közvetlen alkalmazása üregben
A felhasználás mértéke és gyakorisága	- Nagy fertőzöttség: 60-100 g csalétek csalétekállományonként. . - Alacsony fertőzöttség: 40-60 g csalétek csalétekállományonként. - 0 - - Nagy fertőzöttség: 60-100 g csalétek csalétekállományonként - Alacsony fertőzöttség: 40-60 g csalétek csalétekállományonként.
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	A csomag mérete legalább 1,5 kg-tól 25 kg-i. A termék a csomagoláson belül lédig vagy 10-30g tasakban található. Csomagoló tasak anyaga: -műanyag réteggel bevont papír -műanyag kompozit

Ahol alkalmazható A csomagban a tasakokat külön kell csomagolni, és a tasak mérete legfeljebb 10 kg lehet.Csomagolóanyag:

- boríték, műanyag: koextrudált/HDPE/polietilén
- boríték, műanyag: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- boríték, műanyag: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- fémdoboz, papír, karton, doboz, papír, karton borítékkal, benne extrudált/HDPE/poletilén
- vödör: HDPE
- palack :HDPE

4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- védjük a csalétket az időjárás viszontagságaitól, a csalétekállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezjük ki.
- cseréljük ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.
- A kezelési időszak végén távolítsuk el a megmaradó terméket

4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Lédig szemes termék áthelyezéskor viseljük megfelelő légzésvédelmi felszerelést(eldobható légzésvédelmi maszk EN149 FFP2).Ne érjen a termékhez puszta kézzel,viseljen megfelelő védőkesztyűt.
- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassuk az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének használóit) a rágcsálóirtásról
- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsuk el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
- A termék használata csak olyan tartós kezelés alatt álló területeken ajánlott, ahol magas az újrafertőződés esélye vagy ahol más módszerek sikertelennek bizonyultak.
- Folyamatosan ne használjunk véralvadástgátló rágcsálóirtó csalétket a rágcsáló elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsáló aktivitás kimutatására

4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízvezető rendszerek közelébe helyezjük el, biztosítsuk, hogy a csalétket ne érje víz.

4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Szavatossági idő: 24 hónap

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

- Használata előtt olvassa el és kövessük a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelt vagy az értékesítéskor átadott összes információt.
 - végezzünk előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében.
 - távolítsuk el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot). Ettől eltekintve, ne tisztítsuk meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.
 - A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.
 - A terméket azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsáló aktivitást (például vonulási útvonalak, fészkek, takarmányraktár, nyílások, üregek stb.).
 - Ahol lehetséges, a csalétekállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.
 - a csalétekállomáson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsálóirtót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni (lásd az 5.3. pontot a címkén feltüntetendő információkkal kapcsolatban).
 - Ha a terméket nyilvános helyen alkalmazzák, a kezelt területeket meg kell jelölni a kezelés ideje alatt, és a csalétek mellett tájékoztatást kell feltüntetni, amely ismerteti a véralvadást okozó által okozott elsődleges vagy másodlagos mérgezés kockázatát, valamint az elsősegély-nyújtási intézkedéseket mérgezés esetén.
 - A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elhurcolni a csalétekállomásról.
 - A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, használatok és egyéb nem célszervezet állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezjük el.
 - A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezjük el.
 - viseljük vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazása során
 - A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mossunk kezet, és mossuk meg a termékkel közvetlenül érintkezésbe került bőrfelületet.
 - A kezelt területek ellenőrzésének gyakoriságát a kezelést végző személy határozza meg a kezelés kezdetén végzett felmérés alapján.
- E gyakoriságnak összhangban kell állnia a vonatkozó szakmai ajánlásokkal.
- Ha a csalétek fogyasztása a fertőzöttség nyilvánvaló mértékéhez képest alacsony, vegyük fontolóra a csalétekállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formuláció választását.
 - Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétket továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsáló aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot.
- Amennyiben minden más ok kizárható, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegyük fontolóra nem véralvadást okozó rágcsálóirtót, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb véralvadást okozó rágcsálóirtó használatát.
- Alternatív védekezési intézkedésként vegyük fontolóra csapdák alkalmazását.
- „Csalétek-specifikus” használati utasítások:
 - Adagolóeszköz segítségével helyezjük el a csalétket a csalétekállomásban.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

- Lédíig szemes termék áthelyezéskor viseljük megfelelő légzésvédelmi felszerelést (eldobható légzésvédelmi maszk EN149 FFP2). Ne érjen a termékhez puszta kézzel, viseljen megfelelő védőkesztyűt.
 - Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassuk az esetlegesen közelben tartózkodókat a rágcsálóirtásról
 - A termékinformációknak (azaz a címke és/vagy tájékoztató) egyértelműen jelezniük kell, hogy a termék kizárólag szakképzett foglalkozásszerű felhasználók számára értékesíthető, akik a vonatkozó képzési követelményeknek megfelelő tanúsítással rendelkeznek (pl. „kizárólag szakképzett foglalkozásszerű felhasználóknak”).
 - Ne használjuk olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyaggal szemben rezisztencia áll fenn.
 - A termék 35 nap után kizárólag a fertőzöttség állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább
 - A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjunk felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú véralvadást okozókat!
- Váltott alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószert – ha elérhető –, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadást okozó hatóanyagot használjunk.
- Az eltakart és védett rágcsálóirtó pontokon használt csalétekállomásokat vagy szerszámokat két alkalmazás között ne mossuk ki vízzel.
 - A helyi előírások szerint ártalmatlanítsuk az elpusztult rágcsálókat.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

- A termék véralvadásgátló anyagot tartalmaz.

Lenyelés esetén — adott esetben késleltetve jelentkező — tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés. Súlyos esetekben bőrbevérzés, véres vizelet vagy széklet is előfordulhat.

- Ellenszer: Kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1-vitamin.

- Továbbá:

- Bőrrel való érintkezés esetén mossuk le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.

- Szembe kerülés esetén öblítse ki a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel, és legalább 10 percig tartsa nyitva a szemét.

Szájba kerülés esetén gondosan öblítse ki a száját vízzel.

Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon száján át.

Tilos hánytatni.

Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét.

Ha háziállat nyeli le a terméket, forduljunk állatorvoshoz.

- a csalétekállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy felhívni”; rágcsálótírt tartalmaz”; „termék neve vagy az engedély száma”; „hatóanyag” és „baleset esetén forduljunk toxikológiai központhoz

- Veszélyes a vadon élő állatokra.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végén a helyi előírások szerint ártalmatlanítsuk az el nem fogyasztott csalétket és a csomagolást

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

- Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. Az irtószert tartalmazó csomagolás zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó.

- Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

- Szavatossági idő: 24 hónap

6. Egyéb információk

- A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálótírtók a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltják ki a hatásukat.

-A rágcsálók betegséget hordozhatnak. Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintsük meg pusztán kézzel, használjunk kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

- A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

A címkefelirat tartalmazza:

Escatop rágcsálótírtó szer

Hatóanyaga: 0.005% bromadiolon

II. forgalmi kategóriájú irtószert

Engedélytulajdonos: VEBI Istituto Biochimico S.r.l. (Padua, Olaszország)

NNK engedélyszám: HU-2015-MA-14-00125-0000

valamint a jelenlegi dokumentum alábbi pontjai: 2.2., 3.1., 4.1.-4.2. (kivéve a kizárásokra és a csomagolóanyagokra vonatkozó rész) 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei.

A műanyag rágcsálótírtó dobozokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Escatop rágcsálótírtó szer

Hatóanyaga: 0.005% bromadiolon

Ellenszere: K1 vitamin

Engedélytulajdonos: VEBI Istituto Biochimico S.r.l. (Padua, Olaszország)

NNK engedélyszám: HU-2015-MA-14-00125-0000

Továbbá a rágcsálótírtószert tartalmazó műanyag tasakokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Escatop rágcsálótírtó szer

Hatóanyaga: 0.005% bromadiolon

Ellenszere: K1 vitamin