

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

1. Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Forgalmazási terület	Kereskedelmi név
Magyarország	Black Pearl egérintő pép
Magyarország	Flash egérintő pép

1.2. Engedélyes

Engedélyszám	HU-0002669-0000			
Az engedélyezés dátuma	2013-10-14			
Az engedély lejáratának dátuma	2021-06-30			
Az engedélyes neve és címe	Név	LODI S.A.S.		
	Cím	Parc d'Activités des Quatre Routes	35300	Grand Fougeray

1.3. A termék gyártója/gyártói

A gyártó neve	Société CGB Compagnie Générale des Biocides			
A gyártó címe	Parc d'Activités des Quatre Routes	35300	Grand-Fougeray	Franciaország
Gyártási helyek	Parc d'Activités des Quatre Routes	35300	Grand-Fougeray	Franciaország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

A gyártó neve	LODI SAS			
A gyártó címe	Parc d'Activités des Quatre Routes	35300	Grand-Fougeray	Franciaország
Gyártási helyek	HIKAL Ltd. T-21. MIDC Industrial Area Talaja Raigad district	410208	Maharashtra	India

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

BAS szám	EK-szám	CAS-szám	Közhasználati név	IUPAC-név	Funkció	Tartalom (%)
3	240-016-7	15879-93-3	Alfaklorin	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranosa	Hatóanyag	4

RB - Csökkent (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

3.1. Osztályozás

No classification

3.2. Címkézés

Piktogramok

Nem meghatározott

Figyelmeztető mondatok	Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	Gyermekektől elzárva tartandó. Tárolás: élelmiszertől, italoktól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Az eredeti edényben tartandó. A tartalom elhelyezése hulladéként: a nemzeti előírások szerint.	

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1. Lakossági felhasználók részére

Terméktípus	14. I. neméktípus - Rágcsálótörő szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek előfordulása észlelhető.
Felhasználási terület	Beltéri
Felhasználói kör	Zárt térben, egérintésre Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Műs musculus	Házi egér	Ivarartott egyedek
Műs musculus	Házi egér	Fiatal egyedek

Az alkalmazás módja(i)

Módszer Kihelyezhető mérgezett csalétek

Leírás

Dózis: -
Hígítás: 100%

A kezelés száma és időzítése: kismértékű egérrálatomnál: 5 méterenként 1 doboz (5-20 gramm pép);
nagy mértékű egérrálatomnál: 3 méterenként 1 doboz (5-20 gramm pép)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Típus	Anyag	Méret
Csalétkedoboz	Műanyag: öszelet:	5 g
Csalétkedoboz	Műanyag: öszelet:	10 g
Csalétkedoboz	Műanyag: öszelet:	2x10 g
Doboz	Papír, karton	80 g
Doboz	Papír, karton	100 g
Doboz	Papír, karton	120 g
Doboz	Papír, karton	150 g
Doboz	Papír, karton	180 g
Doboz	Papír, karton	200 g
Doboz	Papír, karton	300 g
Doboz	Papír, karton	400 g
Doboz	Papír, karton	500 g
Doboz	Papír, karton	1 kg
Vödör	Műanyag: öszelet:	1 kg

Leírás 5 vagy 10 grammos egyedi tasakok.

Biztonsági jellemzők

4.1.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A műanyag egéretető dobozt tartalmazó kiszerezések külső csomagolásán feltüntetendő:

- A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálórátalom intőszert alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékű egérrálatom felszámolására).
- Az egerek jelenlétére jellegzetes nyomalkból (fészek, lyukak, vonulási utak, ürülék stb.) vagy a rágásuk okozta károkból következtethetünk. A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
- Vegyük számlátába, hogy amennyiben az egerek az érintett helyiel szomszédos épületekben is jelen vannak, a kezelést csak akkor lesz hatásos, ha azokra a területekre is kiterjed.
- A bőrről való érintkezés kerülendő (lehetőség szerint viseljen védőkesztyűt).
- A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint minden, az egerek számára elérhető táplálékforrást távolítsunk el.
- Az egéretető dobozt ne nyissuk fel. A szerelvényt a megfigyelt rágcsálóaktivitás közvetlen közelében – elsősorban a falak mentén, szekrények alatt és a bútorok mögött – helyezzük ki, úgy, hogy a hosszanti oldala a falal érintkezzen, és nyílásai a falhoz eseenek közelebb.
- Az etetőhelyeket első alkalommal 1-3 nap múlva, ezt követően pedig hetente ellenőrizzük, az elfogyasztott csaléteket pótoljuk. A szennyezett vagy penészes csaléteket cseréljük ki. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálók ártalma teljesen meg nem szűnik.
- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.
- Amennyiben a csalétekek érintetlenül maradnak, de az egerek továbbra is jelen vannak, helyezzük át az intőszert máshova.
- Az egerek elpusztulása a fogyasztást követően 24 óra múlva várható.
- A csaléteket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktiválása indokolja.
- A kezelés, a rágcsálók elszaporodásának mértékétől függően, 7-14 napot vehet igénybe. Amennyiben a rágcsálórátalom 14 nap alatt nem csökken, forduljunk kártevőirtó szakemberhez.
- A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtsük össze, az esetlegesen kiszóródott intőszert takarítsuk fel.

A műanyag egéretető dobozt nem tartalmazó kiszerezések külső csomagolásán feltüntetendő:

- A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálórátalom intőszert alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékű egérrálatom felszámolására).
- Az egerek jelenlétére jellegzetes nyomalkból (fészek, lyukak, vonulási utak, ürülék stb.) vagy a rágásuk okozta károkból következtethetünk. A nyomok vagy látható károkozások alapján becsüljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.
- Vegyük számlátába, hogy amennyiben az egerek az érintett helyiel szomszédos épületekben is jelen vannak, a kezelést csak akkor lesz hatásos, ha azokra a területekre is kiterjed.
- A bőrről való érintkezés kerülendő (lehetőség szerint viseljen védőkesztyűt).
- A kezelés megkezdése előtt lehetőség szerint minden, az egerek számára elérhető táplálékforrást távolítsunk el.
- Elsősorban a falak mentén, a szekrények alatt, a bútorok mögött alakítsunk ki ún. etetőhelyeket, amelyekből a rágcsálók elhullásukhoz elegendő mennyiségű intőszert tudnak fogyasztani.
- Lehetőség szerint használjunk olyan műanyag rágcsálóirtó állomást, amellyel biztosítható, hogy a gyermekek, valamint a nem célszervezet állatok (az egyéb vadon élő állatok, illetve a házi- és hásonállatok) ne férhessenek hozzá a csalétekhez.
- A rágcsálóirtó pépet tartalmazó tasakokat azok felnyitása nélkül rögzítsük az etetőállomásban található rúd vagy táska segítségével és gondoskodjunk az állomás stabil rögzítéséről is.
- Ennek hiányában a készítményt rakjuk papír vagy műanyag tálcákra, majd ezeket a falak mentén helyezzük ki, végül borítsunk rájuk egy-egy tetőcserepet vagy más alkalmas fedőlapot úgy, hogy az egerek a csalétekkel megközelíthessék, de ahhoz illetéktelen személyek, gyermekek, valamint a nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá. Az egéretítő pépet tartalmazó tasakokat drót segítségével rögzíthetjük is, hogy azokat a rágcsálók ne hurcolják el.
- Az etetőhelyekre írjuk rá: „Vigyázat! Rágcsálóirtó szert tartalmaz!”
- Az etetőhelyeket első alkalommal 1-3 nap múlva, ezt követően pedig hetente ellenőrizzük, az elfogyasztott csaléteket pótoljuk. A szennyezett vagy penészes csaléteket cseréljük ki. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálók ártalma teljesen meg nem szűnik.
- Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létesítsünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett csalétek mennyiségét viszont ne növeljük.

4.1.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkel párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. Az elhullott rágcsáló tetemét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összegyűjteni, majd egy további zacskóba betenni és összezsugorozva lezárni. A dupla zacskóban levő tetemet zárt hulladékároló edénybe kell helyezni, további kezelése kommunális hulladékként történik.

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2. foglalkozásszerű felhasználók részére

Terméktípus	14. termék típus - Rágcsálfirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)		
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	A készítményt zárt térben, olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek előfordulása észlelhető.		
Felhasználási terület	Beltéri		
Felhasználói kör	Zárt térben, egórtására		
Célszervezetek	Tudományos név Mus musculus	Triviális név Házi egér	Fejlesztési szekciós Ivarerett egyedek Fiatalszervezetek
Az alkalmazás módja(i)			
Módszer	Kihelyezhető mérgezett csalétek		
Leírás	-		
Dózis:	-		
Hígítás:	100%		
A kezelés száma és időtartama:	Kismértékű egérfájdalomnál: 5 méterenként 1 doboz (5-20 gramm pép); nagymértékű egérfájdalomnál: 3 méterenként 1 doboz (5-20 gramm pép)		

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Típus	Anyag	Méret
Csalétkedoboz	Műanyag; összetett:	5 g
Csalétkedoboz	Műanyag; összetett:	10 g
Csalétkedoboz	Műanyag; összetett:	2x10 g
Doboz	Műanyag; összetett:	1 kg
Doboz	Műanyag; összetett:	1,5 kg
Doboz	Műanyag; összetett:	2,5 kg
Doboz	Műanyag; összetett:	3 kg
Doboz	Műanyag; összetett:	5 kg
Vödör	Műanyag; összetett:	1 kg
Vödör	Műanyag; összetett:	1,5 kg
Vödör	Műanyag; összetett:	2,5 kg
Vödör	Műanyag; összetett:	3 kg
Vödör	Műanyag; összetett:	5 kg

Leírás 5 vagy 10 grammos egyedi tasakok

Biztonsági jellemzők -

4.2.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A készítményt olyan helyeken alkalmazzuk, ahol egerek előfordulása észlelhető

A nyomok vagy látható károsodások alapján becsljük meg, milyen mértékben szaporodtak el a rágcsálók, majd a kezelést ennek ismeretében végezzük.

A csalétek kihelyezése előtt lehetőség szerint minden más táplálékforrást távolítsunk el.

A termék használata közben javasolt védőkesztyűt viselni.

Az egérről pépet az etre a célra szolgáló szerelvényben helyezjük az egerek által látogatott helyekre, azok vonulási útjaira illetve feltálatelt búvóhelyük közelébe. Gondoskodjunk az etetőállomások stabil rögzítéséről.

Az egérről dobozt, illetve a pépet tartalmazó tasakokat ne nyissuk fel!

Ügyeljünk arra, hogy a dobozt gyermekek és nem oélszervezet állatok (egyéb vadon élő állatok, illetve házi- és haszonállatok) által hozzá nem férhető, esővíz védett helyre tegyük.

A rágcsálfirtó szer kihelyezésére szolgáló szerelvényeket – a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének megfelelően – feltűnő jelzéssel kell ellátni és azokon jól kell tüntetni a rágcsálfirtó szer nevét, hatóanyagát, ellenszerét valamint az alkalmazó nevét, címét és telefonszámát.

Az etetőhelyeket első alkalommal 1-3 nap múlva, ezt követően pedig hetente ellenőrizzük, a kiürült rágcsálfirtó dobozokat cseréljük le. Az ellenőrzést ezt követően hetente ismételjük meg. A csalétek kihelyezését addig folytassuk, amíg a rágcsálók általma teljesen meg nem szűnik.

Ha a kihelyezett csalétek folyamatosan elfogy, akkor létehetszünk több etetőhelyet, az egyes etetőhelyeken kihelyezett dobozok mennyiségét viszont ne növeljük.

Amennyiben a csalétek érintetlenül maradnak, de az egerek továbbra is jelen vannak, helyezjük át az irtószert máshova.

Az egerek elpusztulása a fogyasztást követően 24 óra múlva várható.

A csaléteket csak addig hagyjuk kint, amíg azt a rágcsálók aktivitása indokolja.

Indokolatlanul ne használjuk a csaléteket folyamatos kihelyezéssel. A készítmény alkalmazását kivánatos integrált kártevőirtási rendszer (IPM/IPC) egyetű bevezetésével összekötni.

A készítmény alkalmazásával, az esetek többségében, 7-14 nap alatt teljes rágcsálfirtó hatást érünk el. Amennyiben a rágcsálók általma ezt követően is tapasztalható, a kezelést egy eltérő (pl. véralvadésgátló) hatóanyagú rágcsálfirtó szerrel folytassuk.

A kezelés után az etetőállomásokat gyűjtjük össze, az esetlegesen kiszóródott irtószert takarítsuk fel.

Rezisztenciakezelés

A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében lórekedjük az eltérő hatásmechanizmusú vegyületet tartalmazó formulációk váltakozó alkalmazására.

Alkalmazzunk integrált kártevőirtási rendszert, melynek a megelőzés, valamint a vegyi módszerek mellett a fizikai módszerek alkalmazása is részét képezi.

A készítmény hatékonyságát a felhasználás során figyelemmel kell követni és az esetleges hatáscsökkenés okait fel kell térni.

Ne alkalmazzuk a terméket olyan esetekben, ahol a hatóanyaggal szembeni rezisztencia gyaníthatóan vagy bizonyítottan fennáll.

Célszerű értesíteni a forgalmazót, amennyiben a termék alkalmazása nem bizonyult hatékonynak, illetve ha rezisztencia jeleket tapasztaljuk.

4.2.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.2.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.2.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A közegészségügyi veszély és a másodlagos mérgezések megelőzése érdekében, az ellenőrzésekkal párhuzamosan gondoskodni kell a kezelés során elpusztult rágcsálók eltávolításáról. A foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók teleminek veszélyes hulladékként (tartó megsemmisítéséről a 225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerinti kötelesek gondoskodni.

4.2.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5 Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

-

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Kizárólag egérintésre és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!

Tilos a készítményt nem ólomszervezet állatok elpusztítására használni.

Az etetőállomások helyét úgy kell kijelölni, hogy a családokhoz sem a gyermekek, sem a nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá.

A csatlékkel tilos élelmiszert, állati takarmánnyal érintkezésbe kerülő felületeken alkalmazni! Munka közben tilos enni, inni vagy dohányozni! Kihelyezés után meleg, szappanos vízzel alaposan kezelt kell mosni.

Beszennyezett, romlott rágcsálótírt szert ne használjon fel.

Élelmiszertől és takarmánytól elkülönítve, gyermek és nem célszervezet állatok által hozzá nem férhető, száraz, hűvös helyen, eredeti csomagolásban tárolandó.

A készítmény mérgező az emlősökre és a madarakra. Ne juttassa a készítményt élővízbe.

Az egérintő pép keserű ízanyagot tartalmaz, amely segíti megelőzni a készítmény véletlen emberi fogyasztását.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Esetlegos mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

Lenyelés esetén:

- Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, illetve címkéjét.
- Hánytatás csak az orvos kifejezett utasítására történhet.
- A lenyelt termék mennyiségétől függetlenül, ne egyen és ne igyon semmit.
- A mérgezettől stabil oldalkékvésbe kell helyezni és védeni kell a hirtelen mozdulatok vagy görcsroham esetén bekövetkező a sérülésektől.
- A mérgezett személy légzését megfigyelés alatt kell tartani.

Bőrré jutáskor:

- Távolítsa el a szennyezett ruházatot.
- A bőrt bő, szappanos vízzel mossa le.
- Ne használjon oldószert, illetve higítószert.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén:

- A szemet tartsa nyitva és néhány percen keresztül bő (lehetőleg szerint langyos) vízzel óvatosan öblítse ki.
- Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem öblítését.
- Panasz jelentkezésekor forduljon szakorvoshoz.

Útmutatás az orvosnak:

A készítmény központi idegrendszen depresszánt, valamint görcsprovokáló hatóanyagot, affektórelőt tartalmaz. A rágcsálótírt szer – lenyelését követően – nárvízű, csökkent reakciókészséget, testhőmérséklet-csökkenést, szívritmus-zavarokat, görcsrohamot, nehézlégzést okozhat. A horgélezárádás korán bekövetkezik.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés után az etetőhelyeket szüntessék meg. Gyűjtésük össze a megmaradt itószert, valamint a rágcsálótírt szerrelvényeket és csatlékek/ormosokat. Gondoskodjunk az esetlegesen kiszóródott itószert feltakarításáról. Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált itószert veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvévi helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni!

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel. (A gyártás idejéi az egyedi csomagolásokon fel kell tüntetni!)

6. Egyéb információk

OEK szakvélemény száma: DD-EPID 226-1/2016

A címkéleírat tartalmazza:

Black Pearl egérintő pép vagy Flash egérintő pép*

Hatóanyaga: 4% affektórelő

Engedélyes: LODI S.A.S. (Parc d'Activités des Quatre Routes, F-35390 Grand Fougeray, Franciaország)
Gyártja: Société CGB – Compagnie Générale des Biocides, Parc d'Activités des Quatre Routes, F-35390 Grand Fougeray, Franciaország
OTH engedélyszám: HU-2013-MA-14-00060-0000
valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai, a csomagolás jellegének függvényében:

Iskoeségi felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4.1. (kivéve a kiszerelesek és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 4.1.1., 4.1.4., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5.

fogalkozászerű felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4.2. (kivéve a kiszerelesek és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 4.2.1., 4.2.4., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5.

A műanyag egérintő dobozokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Black Pearl egérintő pép vagy Flash egérintő pép*

Hatóanyaga: 4% affektórelő

Engedélyes: LODI S.A.S. (Franciaország)

Gyártja: Société CGB (Franciaország)
OTH engedélyszám: HU-2013-MA-14-00060-0000

Továbbá az 5 és 10 grammos filterpapír tasakokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Black Pearl egérintő pép vagy Flash egérintő pép*

Hatóanyaga: 4% affektórelő

*A csomagoláson csak az adott termék kereskedelmi nevét szükséges feltüntetni.