

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: MURIBROM CONSUMER BRODIFACOUM FRESH BAIT

Termék típusa(i): 14. terméktípus - Rágcsálótírtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálótírtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálótírtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálótírtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálótírtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálótírtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2018-SP-14-00229-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0019676-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	2
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	3
4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	4
4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	4
4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	4
4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	4
4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	5
4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	5
4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	5
4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	5
4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	5
4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	6
4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	6
4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	6
4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	6
4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	7
4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	7
4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	8
4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	8

4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	8
4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	8
4.5.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	9
4.5.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	9
4.5.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	9
4.5.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	9
4.5.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	9
4.6.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	10
4.6.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	10
4.6.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	10
4.6.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	10
4.6.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	11
5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások	11
5.1. Használati utasítások	11
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	13
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások	14
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	15
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	15
6. Egyéb információk	15

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Magyarország MURIBROM CONSUMER BRODIFACOUM FRESH BAIT
Magyarország IKEBANA CONSUMER BRODIFACOUM FRESH BAIT
Magyarország BDF CONSUMER BRODIFACOUM FRESH BAIT DIPTRON
Magyarország CONSUMER BRODIFACOUM FRESH BAIT
Magyarország QM CONSUMER BRODIFACOUM FRESH BAIT

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	QUIMICA DE MUNGUIA S.A.
	Cím	DERIO BIDEA 51 48100 MUNGUIA Spanyolország
Engedélyszám	HU-2018-SP-14-00229-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0019676-0000	
Az engedélyezés dátuma	05/02/2014	
Az engedély lejáratának dátuma	31/08/2020	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	QUÍMICA DE MUNGUÍA, S. A
A gyártó címe	Derio Bidea 51 48100 Munguía Olaszország
Gyártási helyek	Derio Bidea 51 48100 Munguía Olaszország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	11 - Brodifakum
A gyártó neve	Activa S.r.l
A gyártó címe	via Feltre, 32 20132 Milano Olaszország
Gyártási helyek	Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Olaszország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Hatóanyag	56073-10-0	259-980-5	0.0025

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén (VER) károsíthatja a szerveket .
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Gyermekektől elzárva tartandó. LENYELÉS ESETÉN:Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.. Expozíció vagy annak gyanúja esetén:Orvosi ellátást kell kérni. A tartalom elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően..

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - felhasználás – házi egerek – foglalkozásszerű felhasználás – beltéri

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus-House mouse-Juveniles to adults
Felhasználási terület	Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
A felhasználás mértéke és gyakorisága	20 g - 40 g csalétek csalétekállomásonként, - 0,0025 - Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	From 1,5 Kg up to 25Kg (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax blocks) Csomagolóanyag: PE/Aluminium/Polyester

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

a csalétekállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétek fogyasztható-e, a csalétekállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétek.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

--

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha a csalétekállomásokat vízelvezető rendszerek közelébe helyezzük el, biztosítsuk, hogy a csalétket ne érje víz.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

--

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

--

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - felhasználás – patkányok – foglalkozásszerű felhasználás – beltéri

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Rattus norvegicus-Brown rat-Juveniles to adults
Felhasználási terület	Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
A felhasználás mértéke és gyakorisága	100 g - 200 g csalétek csalétekállomásonként. - 0,0025 - Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.

Felhasználói kör

Foglalkozásszerű felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

From 1,5 Kg up to 25Kg (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax blocks)
Packaging material: PE/Aluminium/Polyester

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

a csalétekállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétek fogyasztható-e, a csalétekállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétek.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha a csalétekállomásokat vízelvezető rendszerek közelébe helyezzük el, biztosítsuk, hogy a csalétek ne érje víz.

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.3 A felhasználás leírása

Felhasználás 3 - felhasználás – házi egerek és/vagy patkányok – foglalkozásszerű felhasználás – kültéren épületek körül

Terméktípus

14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Nem releváns rágcsálóirtók esetén

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus-House mouse-Juveniles to adults Rattus norvegicus-Brown rat-Juveniles to adults
Felhasználási terület	Other kültéren épületek körül
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
A felhasználás mértéke és gyakorisága	House mice: 20 – 40 g csalétek csalétekállomásonként; Brown rat: 100 g - 200 g csalétek csalétekállomásonként - 0,0025 - Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie
Felhasználói kör	Foglalkozásszerű felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Grams/kg of bait per packed bag: from 1,5 Kg up to 25Kg (containing rodenticide baits of 10-20 g in wax block) Csomagolóanyag: PE/Aluminium/Polyester

4.3.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

védjük a csalétket az időjárás viszontagságaitól. A csalétekállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezjük ki. a csalétekállomásoknál a kezelés megkezdését követően [egerek esetén - legalább 2-3 naponta] [patkányok esetén - csak 5-7 nap elteltével], majd később legalább hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket fogyasztják-e, a csalétekállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétket, cseréljük ki a csalétekállomásban minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.

4.3.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ne alkalmazzuk a terméket közvetlenül üregekben.

4.3.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

- Ha a csalétekállomásokat felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízvezeték rendszerek közelében helyezjük el, biztosítsuk, hogy a csalétket ne érje víz.

4.3.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

--

4.3.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

--

4.4 A felhasználás leírása

Felhasználás 4 - felhasználás – házi egerek – lakossági felhasználás – beltéri

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálótörő szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálótörők esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus-House mouse-Juveniles to adults
Felhasználási terület	Beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
A felhasználás mértéke és gyakorisága	20g - 40g csalétek csalétekállomásonként - 0,0025 - Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Up to 150 g (containing rodenticide baits of 10-20 g in sachet) Csomagolóanyag: PE/Aluminium/Polyester

4.4.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

a csalétekállomásnál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket fogyasztják-e, a csalétekállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétket.

4.4.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

--

4.4.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

--

4.4.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

--

4.4.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

--

4.5 A felhasználás leírása

Felhasználás 5 - felhasználás – patkányok – lakossági felhasználás – beltéri

Terméktípus

14. terméktípus - Rágcsálótörő szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Nem releváns rágcsálótörők esetén

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Rattus norvegicus-Brown rat-Juveniles to adults

Felhasználási terület

Beltéri

Az alkalmazás módja(i)

Csalétek alkalmazása -
Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek

A felhasználás mértéke és gyakorisága

100 g - 200 g csalétek csalétekállomásonként - 0,0025 -
Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.

Felhasználói kör

Lakossági (nem foglalkozásszerű)

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

Up to 150 g (containing rodenticide baits of 10-20 g in sachet)
Csomagolóanyag: PE/Alumínium/Polyester

4.5.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

a csalétekállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétek fogyasztják-e, a csalétekállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétek.

4.5.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.5.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

4.5.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

4.5.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

4.6 A felhasználás leírása

Felhasználás 6 - felhasználás – patkányok – lakossági felhasználás – kültéren épületek körül

Terméktípus

14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Nem releváns rágcsálóirtók esetén

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Rattus norvegicus-Brown rat-Juveniles to adults
Felhasználási terület	Other Kültéren épületek körül
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
A felhasználás mértéke és gyakorisága	100 g - 200 g csalétek csalétekállomásonként. - 0,0025 - Ha több csalétekállomásra van szükség, a csalétekállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Up to 150 g (containing rodenticide baits of 10-20 g in sachet) Csomagolóanyag:: PE/Aluminium/Polyester

4.6.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

a csalétekállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezzük ki. cseréljük ki a csalétekállomásban minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött. a csalétekállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket fogyasztják-e, a csalétekállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótoljuk a csalétket.

4.6.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

4.6.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

4.6.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

4.6.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

--

5. Meta SPC felhasználására vonatkozó általános iránymutatások

5.1. Használati utasítások

Foglalkozásszerző felhasználók :

Használata előtt olvassa el és kövessük a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.

- végezzünk előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében.

távolítsuk el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot).

Ettől eltekintve, ne tisztítsuk meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.

- A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.

vegyük fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, esetleges élelmiszer és ital eltávolítása, amennyire lehetséges) a termék elfogyasztásának elősegítése, valamint az ismételt elszaporodás valószínűségének csökkentése érdekében.

- a csalétekállomásokat azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsáló aktivitást (például vonulási útvonalak, tészek, takarmányraktár, nyílások, üregek stb.).

- Ahol lehetséges, a csalétekállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.

- a csalétekállomáson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsálót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni (lásd az 5.3. pontot a címkén feltüntetendő információkkal kapcsolatban).

[...] Ha a terméket nyilvános helyen alkalmazzák, a kezelt területeket meg kell jelölni a kezelés ideje alatt, és a csalétek mellett tájékoztatást kell felütni, amely ismerteti a véralvadást okozó által okozott elsődleges vagy másodlagos mérgezés kockázatát, valamint az elsősegély-nyújtási intézkedéseket mérgezés esetén.

- A csalétek úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elhurcolni a csalétekállomástól.

- A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célszervezet állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezzük el.

- A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezzük el.

[Ahol a kockázatértékelés alapján szükséges:

viseljünk vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazása során (az engedélyesnek meg kell adni a kesztyű anyagát a termékinformációk között)

Amennyiben szükséges, írjon elő további egyéni védőfelszerelést (például szemüveget vagy maszkot) a termék alkalmazásához]

A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

A termék alkalmazása után mossunk kezet, és mossuk meg a termékkel közvetlenül érintkezésbe került bőrfelületet.

- Ha a csalétek fogyasztása a fertőzöttség nyilvánvaló mértékéhez képest alacsony, vegyük fontolóra a csalétekállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formuláció választását.

Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétek továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsáló aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot.

Amennyiben minden más okot kizárt, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegyük fontolóra más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószer, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb véralvadástgátló hatóanyagú rágcsálóirtószer használatát.

Alternatív védekezési intézkedésként vegyük fontolóra csapdák alkalmazását.

- A kezelési időszak végén távolítsuk el a megmaradt csalétket vagy a csalétekállomásokat.

„Csalétek-specifikus” használati utasítások:

Csalétek tasakban: Ne bontsa fel a csalétket tartalmazó tasakot.

Pép:

a) [Ahol indokolt] Megfelelő hosszúságú applikátorral (spatulával) helyezzük el a pép állagú csalétket, hogy csökkentse a kéz expozícióját - ne nyúljon a vödörbe.

b) [Ahol indokolt] Adja meg, hogyan kell megtisztítani az eszközt (például spatulát), és hogyan kerülhető el a csalétek maradékával való érintkezés.

Laza pellet-granulátum, szemes: Adagolóeszköz segítségével helyezzük el a csalétket a csalétekállomásban. Adja meg a por minimalizására szolgáló módszereket (például nedves törölkendő).

Lakossági felhasználók

Használat előtt olvassa el és kövessük a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.

- A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálóirtalom irtószer alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékű egérirtalom felszámolására).

- távolítsuk el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot).

Ettől eltekintve, közvetlenül a kezelés előtt ne bolygassuk a területet, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.

- a csalétekállomásokat annak a helynek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol rágcsáló aktivitást figyeltek meg (például vonulási útvonalak, fészkek, lyukak, üregek stb.).

- Ahol lehetséges, a csalétekállomást a falhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.

- [Ne nyissuk ki a csalétket tartalmazó tasakot - amennyiben releváns a termékben lévő csalétek formuláció tekintetében].

- a csalétekállomásokat gyermekek, madarak, háziállatok, használlatok és egyéb nem célszervezet állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezzük el.

- a csalétekállomásokat élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezzük el.

- a csalétekállomásokat ne helyezzük el vízelvezető rendszerek közelébe, ahol víz érheti azokat.

A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

A termék alkalmazása után mossunk kezet, és mossuk meg a termékkel közvetlenül érintkezésbe került bőrfelületet.

- A kezelési időszak végén távolítsuk el a megmaradt csalétket vagy a csalétekállomásokat.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Foglalkozásszerű felhasználók :

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassuk az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének használóit) a rágcsálótársról [adott esetben a vonatkozó bevált gyakorlattal összhangban].

- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran (például hetente legalább kétszer) keressük meg és távolítsuk el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat. [...].

- A termék 35 nap után kizárólag a fertőzöttség állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább.

- Folyamatosan ne használjunk véralvadástgátló hatóanyagot tartalmazó csalétket a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására.

A termékinformációknak (azaz a címkének és/vagy tájékoztatónak) egyértelműen jelezniük kell az alábbiakat:

A termék nem értékesíthető a lakosság számára (például „kizárólag foglalkozásszerű felhasználók számára”).

- a terméket megfelelő, zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban kell alkalmazni (pl. „kizárólag zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban használandó”).

- a felhasználóknak az alkalmazási előírás 5.3. pontjában említett információknak megfelelően fel kell címkézniük a csalétekállomásokat (pl. „a csalétekállomások címkézését a termékajánlásokkal összhangban kell elvégezni”).

A terméknek 35 napon belül el kell pusztítania a rágcsálókat.

A termékinformációk között (azaz a címkén és/vagy tájékoztatón) egyértelműen javasolni kell, hogy amennyiben a kezelés nem tűnik hatékonynak (azaz továbbra is rágcsálói aktivitás észlelhető), a felhasználónak a termék értékesítőjéhez vagy kártevőirtó szakemberhez kell fordulnia.

- Ne mossuk meg vízzel a csalétekállomást az egyes alkalmazások között.

A helyi előírások szerint ártalmatlanítsuk az elpusztult rágcsálókat [...].

Lakossági felhasználók

vegyük fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

- Folyamatosan ne használjunk véralvadástgátló rágcsálótó csalétket (például rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására).

A termékinformációknak (azaz a címkének és/vagy tájékoztatónak) egyértelműen jelezniük kell az alábbiakat:

- a terméket megfelelő, zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban kell alkalmazni (pl. „kizárólag zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban használandó”).

- a felhasználóknak az alkalmazási előírás 5.3. pontjában említett információknak megfelelően fel kell címkézniük a csalétekállomásokat (pl. „a csalétekállomások címkézését a termékajánlásokkal összhangban kell elvégezni”).

A terméknek 35 napon belül el kell pusztítania a rágcsálókat.

A termékinformációk között (azaz a címkén és/vagy tájékoztatón) egyértelműen javasolni kell, hogy amennyiben a kezelés nem tűnik hatékonynak (azaz továbbra is rágcsálói aktivitás észlelhető), a felhasználónak a termék értékesítőjéhez vagy kártevőirtó szakemberhez kell fordulnia.

- Legalább a csalétekállomások ellenőrzésének megfelelő gyakorisággal távolítsuk el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.

A helyi előírások szerint ártalmatlanítsuk az elpusztult rágcsálókat [...].

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóírtók a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltják ki hatásukat.

A rágcsálók betegséget hordozhatnak.

Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintsük meg puszta kézzel, használjunk kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

- A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

[...] A termék csomagolását gyermekbiztonság tekintetében bevizsgálták.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A kezelés végén a helyi előírások szerint ártalmatlanítsuk az el nem fogyasztott csaléteket és a csomagolást [...].

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. Az irtószert tartalmazó csomagolás zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó.

- Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

- Szavatossági idő:

2 years

6. Egyéb információk

A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóírtók a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltják ki hatásukat.

A rágcsálók betegséget hordozhatnak.

Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintsük meg puszta kézzel, használjunk kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

- A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.