

Engedélyezési lap

1. Az irtószer neve: Neporex® 2 SG légylárvairtó granulátum

2. Gyártja: Shirm AG., Division Sifokan (Baar-Ebenhausen, Németország)

3. Forgalomba hozza: Elanco Tiergesundheit AG Magyarországi Fióktelepe
1075 Budapest, Madách Imre u. 13-14.

4. Engedély száma: 31198-5/2019/JIF

5. Terméktípus és minősítés:

5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus

5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer

6. Hatóanyaga: 2 % ciromazin

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:

Sárgásfehér színű, 1-4 mm nagyságú, vízben oldható granulátum. Hatóanyaga a rovarnövekedést szabályozók közé tartozó ciromazin, a légylárvák fejlődésében morfológiai elváltozásokat okoz, és ezáltal megakadályozza az imágók normális kifejlődését.

8. Csomagolás:

- 250 gramm és 1 kg töltőtömeggel műanyag dobozban,
- 5 kg töltőtömeggel többretegű műanyag zsákban,
- 70 kg töltőtömeggel polietilén zsákban, fémhordóban kerül forgalomba.

9. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, különleges tárolási körülményeket nem igényel.

A gyártástól számítva 5 évig használható fel.

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!)

10. Felhasználhatóság kártevők szerint:

Állati trágyában fejlődő légylárvák irtására használható fel.

11. Használati utasítás:

A Neporex® 2 SG légylárvairtó granulátum a légytenyésztő helyekre háromféle módon juttatható ki (10 m² felület kezelésére szükséges mennyiség):

– *kiszórással:* 250 g NEPOREX® 2 SG. A készítményt nedves vagy vizes trágyára egyenletesen szórjuk ki.

– *permetezéssel:* 250 g Neporex® 2 SG + 2,5 liter víz. A kiszámított mennyiségű készítményt a megfelelő vízmennyiséggel keverjük össze, majd a munkaoldatot peremezővel juttassuk a légytenyésztő helyekre.

– *öntözéssel:* 250 g Neporex 2® SG + 7,5 liter víz. A kiszámított mennyiségű készítményt a megfelelő vízmennyiséggel keverjük össze, majd a munkaoldatot öntöző kannával juttassuk a légytenyésztő helyekre.

Alkalmazás előtt gondosan mérjük fel az összes légytenyésztő helyet, és azokat egyszerre kezeljük. A kezelésekre az istállózási rendszertől és az időjárási függően 2-3 hét – több hónap közötti gyakorisággal kerülhet sor.

Alkalmazása borjú nevelőkben:

Mélyalomban: az etető és itató berendezések alatt és a falak mentén kb. 50 cm széles csíkokat alakítsunk ki, továbbá kezeljük azokat az alomrészeket, amiket nem tapostak keményre az állatok, és ott, ahol az alom átnedvesedett.

Külső borjúkarámokban: kezeljük az egész felületet, majd ismétljük meg a kezelést minden kialmozás után vagy amikor az alomban légylárvák jelennek meg.

A permetezéssel vagy öntözéssel történő kezelést 3 nappal a kialakozást követően alkalmazzuk, majd azt ismétljük meg minden takarítás után vagy abban az esetben, ha a trágában légylárvák jelennek meg.

Borjak rácspadozaton: a kialakozás után a trágya akna kiszórásos kezelését azonnal végezzük el, majd ismétljük meg a következő kialakozáskor vagy abban az esetben, ha a trágában légylárvák jelennek meg.

Alkalmazása sertésólban:

Egyszeri ürítéssel-telepítéssel rendszerben: a takarítás után azonnal vagy a malacok betelepítése előtt kiszórással történjen a kezelés.

Mélyalmos rendszerben: a trágya eltávolítása kb. 3 nappal után a kezelést permetezéssel vagy öntözéssel végezzük, majd azt ismétljük meg minden kitrágázás után vagy abban az esetben, ha a trágában légylárvák jelennek meg. Fordítsunk kiemelt figyelmet a trágafelület egészének, illetve az etetők és itatók körüli nedves felületek kezelésére.

Alkalmazása baromfi istállóban:

A trágya egész felületét 1 héttel a trágya eltávolítása után kezeljük, majd azt ismétljük meg minden kitrágázás után vagy abban az esetben, ha a trágában légylárvák jelennek meg.

Alkalmazása egyéb állattartó helyeken:

A kezeléseket 1-3 nappal a trágya felhalmozódását követően 1-3 nappal végezzük el, majd azt 2 hét múlva ismétljük meg.

Mivel a készítmény csak a légylárvákra hat, ezért a kifejlett legyek elpusztítása érdekében az imágókat az AGITA 10 WG légyirtó kenőanyag alkalmazásával pusztítsuk el.

12. Figyelmeztetés:

Élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen tárolandó! Óvakodjunk attól, hogy a készítmény az itatókba, vagy a vályúkba kerüljön! Munkavégzés után meleg, szappanos vízzel kezdet kell mosni. Ügyeljünk arra, hogy a permetet ne lélegezzük be, és ne kerüljön a szembe. Lenyeléskor azonnal forduljunk orvoshoz!

13. Címkefelirat:

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11., 12. és 13. pontokat.

Ezen túlmenően a címkének tartalmaznia kell az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP-rendelet) szerint kötelezően feltüntetendő címkeelemeket.

14. Biocid szakvélemény száma: 31198-2/2019/JIF