

**MELLÉKLET:**

**A biocid termék jellemzőinek összefoglalója**

Prokum Paszta rágcsálóirtó pép

- 14. terméktípus – Rágcsálóirtó szerek (Kártevők elleni védekezésre használt szerek)
- 14. terméktípus – Rágcsálóirtó szerek (Kártevők elleni védekezésre használt szerek)
- 14. terméktípus – Rágcsálóirtó szerek (Kártevők elleni védekezésre használt szerek)
- 14. terméktípus – Rágcsálóirtó szerek (Kártevők elleni védekezésre használt szerek)
- 14. terméktípus – Rágcsálóirtó szerek (Kártevők elleni védekezésre használt szerek)
- 14. terméktípus – Rágcsálóirtó szerek (Kártevők elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2014-MA-14-00080-0001

R4BP eszközszám: HU-0005021-0000

## 1. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

### 1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	Prokum Paszta rágcsálóirtó pép Vertox rágcsálóirtó pép Metatox rágcsálóirtó pép (lakossági felhasználásra) Metatox rágcsálóirtó pép Pro (szakképzett foglalkozásszerű felhasználóknak)
------------------	---

### 1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	PelGar International Limited
	Cím	18 rue des Remparts d'Ainay, 69002 Lyon Franciaország
Engedélyszám	HU-2014-MA-14-00080-0001	
<i>R4BP</i> eszközszám	HU-0005021-0000	
Az engedélyezés dátuma	18/07/2013	
Az engedély lejáratának dátuma	31/08/2020	

### 1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	PelGar International Limited
A gyártó címe	Unit 13, Newman Lane, GU34 2QR Alton, Hants Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Unit 13, Newman Lane, GU34 2QR Alton, Hants Egyesült Királyság METATOX Peszticid Gyártó-, és Forgalmazó Kft., Kossuth utca 8., 5520 Szeghalom Magyarország

### 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	Brodifakum
A gyártó neve	PelGar International Limited
A gyártó címe	Unit 13, Newman Lane, GU34 2QR Alton, Hants Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Prazska 54, 280 02 Kolin Csehország

## 2. A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

### 2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-	Hatóanyag	56073-10-0	259-980-5	0.0025

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
	tetrahydro -1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin				

## 2.2. Az előállítás típusa

Felhasználásra kész csalétek: pép

## 3. FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket (vér).
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	A por belélegzése tilos. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni. A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi előírások szerint.

## 4. ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

### 4.1. A felhasználás leírása

#### 1 táblázat. # 1 – házi egerek - lakossági felhasználás - beltér használata

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus házi egér fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri -
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett etetőállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	1-2 tasak/etetőállomás - - Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek, nagymértékű egérirtalom esetén 2 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10, 12 és 15 g-os filterpapír tasakok műanyag zacskóban, műanyag vödörben vagy kartondobozban legfeljebb 50 g össz tömeggel

	10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g vagy 50g pép farostlemez vagy műanyag tálcán hőhegesztett fedéllel kartondobozban legfeljebb 50 g össz tömeggel 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g vagy 50g pép műanyag tálcán hőhegesztett fedéllel műanyag etetődobozban legfeljebb 50 g össz tömeggel 1 vagy 2 db 10 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1 db 12 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1 db 15 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1, 2 vagy 3 db 15 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1, 2, 3, 4 vagy 5 db 10 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban
--	---

#### 4.1.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Az etetőállomásoknál a kezelés kezdetén legalább 2-3 naponta, majd később hetente ellenőrizni kell, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.

#### 4.1.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

#### 4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

## 4.2. A felhasználás leírása

### 2 táblázat. # 2 – patkányok – lakossági felhasználás – beltéri használata

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Rattus norvegicus vándorpatkány fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri -
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett etetőállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	1-4 db 15 g-os vagy 1-5 db 12 g-os vagy 1-6 db 10 g-os tasak 5-10 méterenként - - Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek, nagymértékű patkányártalom esetén 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10, 12 és 15 g-os filterpapír tasakok műanyag zacskóban, műanyag vödörben vagy kartondobozban legfeljebb 150 g összömeggel 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g vagy 60g pép farostlemez vagy műanyag tálcán hőhegesztett fedéllel kartondobozban legfeljebb 150 g összömeggel 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g vagy 60g pép műanyag tálcán hőhegesztett fedéllel műanyag etetődobozban legfeljebb 150 g összömeggel 1 vagy 2 db 10 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1 db 12 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1 db 15 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1, 2 vagy 3 db 15 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1, 2, 3, 4 vagy 5 db 10 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban

#### 4.2.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.

#### 4.2.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

#### 4.2.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.2.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.2.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

### 4.3. A felhasználás leírása

#### 3 táblázat. # 3 – patkányok – lakossági felhasználás – kültéren épületek körül használata

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Rattus norvegicus vándorpatkány

	fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Kültéri -
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett etetőállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	1-4 db 15 g-os vagy 1-5 db 12 g-os vagy 1-6 db 10 g-os tasak 5-10 méterenként - Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek, nagymértékű patkányártalom esetén 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10, 12 és 15 g-os filterpapír tasakok műanyag zacskóban, műanyag vödörben vagy kartondobozban legfeljebb 150 g összömeggel 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g vagy 60g pép farostlemez vagy műanyag tálcán hőhegesztett fedéllel kartondobozban legfeljebb 150 g összömeggel 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g vagy 60g pép műanyag tálcán hőhegesztett fedéllel műanyag etetődobozban legfeljebb 150 g összömeggel 1, 2 vagy 3 db 15 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1, 2, 3, 4 vagy 5 db 10 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban

#### 4.3.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.  
Cseréljen ki az etetőállomásban minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszennyeződött.  
Az etetőállomásoknál a kezelés megkezdését követően csak 5-7 nap elteltével, majd később legalább hetente kell ellenőrizni, hogy a csalétket elfogyasztják-e, az etetőállomások épek-e, valamint el kell távolítani az elhullott rágcsálókat. Szükség esetén pótolja a csalétket.

#### 4.3.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

#### 4.3.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.3.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.3.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek

mellett

-

#### 4.4. A felhasználás leírása

##### 4 táblázat. # 4 – házi egerek és/vagy patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – beltéri használata

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus házi egér fiatal és ivarérett egyedek Rattus norvegicus vándorpatkány fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri -
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett etetőállomásban vagy eltakart és védett rágcsálóirtó pontokon - alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Legfeljebb 20 g pép etetőállomásonként házi egér irtásakor, legfeljebb 60 g pép etetőállomásonként patkányok irtásakor - -  Házi egerek irtásakor: ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek, nagymértékű egérártalom esetén 2 méternek kell lennie. Patkányok irtásakor: ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek, nagymértékű patkányártalom esetén 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10, 12 és 15 g-os filterpapír tasakok műanyag zacskóban, műanyag vödörben vagy kartondobozban legfeljebb 20 kg összömeggel 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g vagy 60g pép farostlemez vagy műanyag tálcán hőhegesztett fedéllel kartondobozban legfeljebb 20 kg összömeggel 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g vagy 60g pép műanyag tálcán hőhegesztett fedéllel műanyag etetődobozban legfeljebb 20 kg összömeggel 1 vagy 2 db 10 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1 db 12 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1 db 15 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban

	1, 2 vagy 3 db 15 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1, 2, 3, 4 vagy 5 db 10 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban Ömlesztett, spatulával kihelyezhető pép műanyag zacskóban legfeljebb 5 kg össztömeggel 50, 100, 150, 200 vagy 300 g-os műanyag patronok kartondobozban vagy anélkül legfeljebb 3,6 kg össztömeggel
--	---

#### 4.4.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A kezelési időszak után távolítsa el a megmaradó terméket.

Kövesse a vonatkozó helyi előírásokban/helyes kártevőirtási gyakorlatban szereplő további útmutatásokat. Pulzáló kihelyezés esetén: az elfogyasztott csalétket a kihelyezés után 3 nap elteltével és utána legfeljebb 7 naponta cserélje.

#### 4.4.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcsálóirtásról [adott esetben a helyi előírásokkal/helyes kártevőirtási gyakorlattal összhangban] ”.

Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.

A terméket ne használja tartósan csalétként a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására.

#### 4.4.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőállomásokat vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

#### 4.4.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.4.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltartathatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

#### 4.5. A felhasználás leírása

##### 5 táblázat. # 5 – felhasználás – egerek és/vagy patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – kültéren épületek körül használata

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus házi egér fiatal és ivarérett egyedek



	Rattus norvegicus vándorpatkány fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Kültéri -
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett etetőállomásban vagy eltakart és védett rágcásálóirtó pontokon - alkalmazandó felhasználásra kész csalétek
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Legfeljebb 20 g pép etetőállomásonként házi egér irtásakor, legfeljebb 60 g pép etetőállomásonként patkányok irtásakor - - Házi egerek irtásakor: ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek, nagymértékű egérirtalom esetén 2 méternek kell lennie. Patkányok irtásakor: ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 10 méternek, nagymértékű patkányirtalom esetén 5 méternek kell lennie.
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10, 12 és 15 g-os filterpapír tasakok műanyag zacskóban, műanyag vödörben vagy kartondobozban legfeljebb 20 kg összömeeggel 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g vagy 60g pép farostlemez vagy műanyag tálcán hőhegesztett fedéllel kartondobozban legfeljebb 20 kg összömeggel  10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g vagy 60g pép műanyag tálcán hőhegesztett fedéllel műanyag etetődobozban legfeljebb 20 kg összömeggel  1 vagy 2 db 10 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1 db 12 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1 db 15 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1, 2 vagy 3 db 15 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1, 2, 3, 4 vagy 5 db 10 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban  Ömlesztett, spatulával kihelyezhető pép műanyag zacskóban legfeljebb 5 kg összömeggel  50, 100, 150, 200 vagy 300 g-os műanyag patronok kartondobozban vagy anélkül legfeljebb 3,6 kg összömeggel

#### 4.5.1. Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

Védje a csalétket az időjárás viszontagságaitól. Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.

Cseréljen ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megrongált vagy amely elszenyeződött.

A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó terméket.

Kövesse a gyakorlatokban szereplő további útmutatásokat.

Pulzáló kihelyezés esetén: az elfogyasztott csalétket a kihelyezés után 3 nap elteltével és utána legfeljebb 7 naponta cserélje.

#### 4.5.2. Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének felhasználóit) a rágcsálóirtásról [adott esetben a vonatkozó bevált gyakorlattal összhangban]”. Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.

A terméket ne használja tartósan csalétekként a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására.

Ne alkalmazza a terméket közvetlenül üregekben.

#### 4.5.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

#### 4.5.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.5.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

#### 4.6. A felhasználás leírása

##### 6 táblázat. # 6 – patkányok – szakképzett foglalkozásszerű felhasználók – csatornák használata

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Rattus norvegicus vándorpatkány fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Csatornák
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása  A használatra kész csalétket olyan módon lehet kihelyezni vagy alkalmazni, ahol nem érheti szennyvíz.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	200g - 300g pép 30-50 méterenként - - Legfeljebb 300g pép csatornafedelenként
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	10, 12 és 15 g-os filterpapír tasakok műanyag zacskóban, műanyag vödörben vagy kartondobozban legfeljebb 20 kg össztömeggel

	10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g vagy 60g pép farostlemez vagy műanyag tálcán hőhegesztett fedéllel kartondobozban legfeljebb 20 kg össz tömeggel 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g vagy 60g pép műanyag tálcán hőhegesztett fedéllel műanyag etetődobozban legfeljebb 20 kg össz tömeggel 1 vagy 2 db 10 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1 db 12 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1 db 15 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1, 2 vagy 3 db 15 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban 1, 2, 3, 4 vagy 5 db 10 g-os filterpapír tasak műanyag etetődobozban Ömlesztett, spatulával kihelyezhető pép műanyag zacskóban legfeljebb 5 kg össz tömeggel 50, 100, 150, 200 vagy 300 g-os műanyag patronok kartondobozban vagy anélkül legfeljebb 3,6 kg össz tömeggel
--	--

#### 4.6.1. *Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A csalétket úgy kell elhelyezni, hogy ne érje víz, és ne mosódhasson ki. Kövesse a helyes kártevőirtási gyakorlatokban szereplő további útmutatásokat.

#### 4.6.2. *Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Kizárólag olyan csatornahálózatban helyezze ki a csalétket, amely kapcsolódik a szennyvíztisztító telephez. Ne alkalmazza a terméket pulzáló / ritmusos kihelyezési mennyiséggel.

#### 4.6.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

-

#### 4.6.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

-

#### 4.6.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

-

## 5. ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS<sup>1</sup>

### 5.1. **Használati utasítások**

#### **Lakossági felhasználók:**

Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.

A mérgezett csalétek kihelyezése előtt mérlegeljük, hogy a tapasztalt rágcsálóártalom irtószer alkalmazása nélkül nem oldható-e meg hatékonyan (pl. mechanikus csapda használata kismértékű egérártalom felszámolására).

Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékok).

Ettől eltekintve, közvetlenül a kezelés előtt ne bolygassa a területet, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló

<sup>1</sup> Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.

Az etetőállomásokat annak a helynek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol rágcsálói aktivitást figyeltek meg (például vonulási útvonalak, fészkek, lyukak, üregek stb.).

Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.

Ne nyissa ki a csalétket tartalmazó tasakot

Az etetőállomásokat gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.

Az etetőállomásokat élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.

Az etetőállomásokat ne helyezze el vízelvezető rendszerek közelében, ahol víz érheti azokat.

A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.

A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó csalétket vagy az etetőállomásokat.

Kerülje a bőrrel való érintkezést a megmaradt irtószer ártalmatlanítása során.

### **Szakképzett foglalkozásszerű felhasználók:**

Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelte vagy az értékesítéskor átadott összes információt.

Végezzen előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében.

Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot).

Ettől eltekintve, ne tisztítsa meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.

A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.

A terméket azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsálói aktivitást (például vonulási útvonalak, fészkek, takarmányraktár, nyílások, üregek stb.).

Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.

Az etetőállomáson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsálóirtót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni (lásd az 5.3. pontot a címkén feltüntetendő információkkal kapcsolatban).

Ha a terméket nyilvános helyen alkalmazzák, a kezelt területeket meg kell jelölni a kezelés ideje alatt, és a csalétek mellett tájékoztatást kell feltüntetni, amely ismerteti a véralvadásgátló által okozott elsődleges vagy másodlagos mérgezés veszélyét, valamint az elsősegély-nyújtási intézkedéseket mérgezés esetén.

A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elvinni az etetőállomásról.

A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.

A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.

Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazása során.

Amennyiben szükséges, írjon elő további egyéni védőfelszerelést (például szemüveget vagy maszkot) a termék alkalmazásához]

A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.

A kezelt területek ellenőrzésének gyakoriságát a kezelést végző személy határozza meg a kezelés kezdetén végzett felmérés alapján.

E gyakoriságnak összhangban kell állnia a vonatkozó helyes gyakorlati kódex által adott ajánlásokkal.

Ha a csalétek felvétele a fertőzöttség nyilvánvaló méretéhez képest alacsony, vegye fontolóra az etetőállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formuláció választását.

Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétket továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsálói aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot.

Amennyiben minden más okot kizárt, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegye fontolóra nem véralvadásgátló rágcsálóirtó, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb véralvadásgátló rágcsálóirtó használatát.

Alternatív védekezési intézkedésként vegye fontolóra csapdák alkalmazását.

Ne bontsa ki a csalétket tartalmazó tasakot.

Megfelelő hosszúságú applikátorral (spatulával) helyezze el a csalétket, hogy csökkentse a kéz expozícióját - ne

nyúljon a vödörbe. Az eszközt (pl. spatulát) papírtörülkövel vagy nedves törölközővel tisztítsa meg.

## 5.2. Kockázatsökkentő intézkedések

### Lakossági felhasználók:

Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.

Ne használjon tartósan véralvadást gátló rágcsálóirtó csalétket (például rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsálói aktivitás kimutatására).

A terméket zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett etetőállomásban kell alkalmazni.

Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; „rágcsálóirtót tartalmaz”; „termék

neve vagy az engedély száma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai

Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)

A termék 35 napon belül elpusztítja a rágcsálókat.

Amennyiben a kezelés nem tűnik hatékonynak (azaz továbbra is rágcsálói aktivitás észlelhető), a felhasználónak a termék értékesítőjéhez vagy kártevőirtóhoz kell fordulnia.

Legalább az etetőállomások ellenőrzésének megfelelő gyakorisággal távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.

Az elhullott rágcsáló tetemét védőkesztyűben, kifordított műanyag zacskó segítségével kell összeszedni, majd egy további zacskóba beletenni és összecsomózva lezárni. A dupla zacskóban levő tetemet zárt hulladéktároló edénybe kell helyezni; további kezelése kommunális hulladékként történik.

### Szakképzett foglalkozásszerű felhasználók:

Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat a rágcsálóirtásról.

Ne használja olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyag elleni rezisztencia áll fenn.

A termék 35 nap után kizárólag a fertőzöttség állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább.

A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjon felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú véralvadást gátlókat!

Váltott alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószert – ha elérhető –, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadást gátló hatóanyagot használjon.

Az eltakart és védett rágcsálóirtó pontokon használt csapdákat vagy szerszámokat két alkalmazás között ne mossa ki vízzel.

## 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

A termék véralvadást gátló anyagot tartalmaz.

Lenyelés esetén — adott esetben késleltetve jelentkező — tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés.

Súlyos esetekben bőrbevérzés, véres vizelet vagy széklet is előfordulhat.

Ellenszer: Kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1-vitamin.

Továbbá:

Bőrrel való érintkezés esetén mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.

Szembe kerülés esetén: ha a sérült visel kontaktlencsét, távolítsa el, majd néhány percen keresztül öblögesse a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.

Szájba kerülés esetén gondosan öblítse ki a száját vízzel.

Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át.

Tilos hánytatni.

Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét.

Ha háziállat nyeli le a terméket, forduljon állatorvoshoz.

Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; „rágcsálóirtót tartalmaz”; „termék neve vagy az engedély száma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99) Veszélyes a vadon élő állatokra.

#### **5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert és etetőállomásokat veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvevő helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

A szakképzett foglalkozásszerű felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.

#### **5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. A doboz zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó.

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

Szavatossági idő: 2 év

## **6. EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóirtó a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltja ki hatását.

A rágcsálók betegséget hordozhatnak.

Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintse meg pusztá kézzel, használjon kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

A címkefelirat tartalmazza:

Prokum Paszta rágcsálóirtó pép , Vertox rágcsálóirtó pép, Metatox rágcsálóirtó pép (lakossági) vagy Metatox rágcsálóirtó pép Pro (szakképzett foglalkozásszerű)\*

Hatóanyaga: 0,0025% brodifakum

Engedélyes: PelGar International Ltd.

Biocid engedélyszám: HU-2014-MA-14-00080-0001

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai és a forgalmazási kategóriára vonatkozó besorolást, a felhasználói kör függvényében:

lakossági felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4.1-4.3 (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószert

szakképzett foglalkozásszerű felhasználók részére: 2.2., 3.1., 4.4-4.6 (kivéve a kiserelések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei

II. forgalmazási kategóriájú irtószert

A műanyag rágsálóirtó dobozokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Prokum Paszta rágsálóirtó pép , Vertox rágsálóirtó pép, Metatox rágsálóirtó pép (lakossági) vagy Metatox rágsálóirtó pép Pro (szakképzett foglalkozásszerű)\*

Hatóanyaga: 0,0025% brodifakum

Ellenszere: K1-vitamin

Engedélyes: PelGar International Ltd.

Továbbá a rágsálóirtószer tartalmazó filterpapír tasakokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Prokum Paszta rágsálóirtó pép , Vertox rágsálóirtó pép, Metatox rágsálóirtó pép (lakossági) vagy Metatox rágsálóirtó pép Pro (szakképzett foglalkozásszerű)\*

Hatóanyaga: 0,0025% brodifakum

Ellenszere: K1-vitamin

\*Minden esetben csak egy név szerepeljen