

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: Prokum Pro rágcsálóirtó granulátum

Termék típusa(i): 14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2015-MA-00140-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0012874-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	4
4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	5
4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	5
4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	5
4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	5
4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások	7
4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések	7
4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az	7
4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására	7
4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos	8
5. Általános használati utasítás	8
5.1. Használati utasítások	8
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	8
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások	9
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	9
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	9
6. Egyéb információk	9

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

Prokum Pro rágcsálóirtó granulátum

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	PelGar International Limited
	Cím	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Egyesült Királyság
Engedélyszám	HU-2015-MA-00140-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0012874-0000	
Az engedélyezés dátuma	18/07/2013	
Az engedély lejáratának dátuma	26/04/2023	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	PelGar International Limited
A gyártó címe	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Egyesült Királyság
	Agrochema 675 02 Konesin Csehország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	11 - Brodifakum
A gyártó neve	PelGar International Limited
A gyártó címe	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Egyesült Királyság
Gyártási helyek	Prazska 54 280 02 Kolin Csehország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Brodifakum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Hatóanyag	56073-10-0	259-980-5	0.005

2.2. Az előállítás típusa

RB - Csalétek (felhasználásra kész)

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok	<p>Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén . károsíthatja a szerveket (vér).</p> <p>Károsíthatja a születendő gyermeket.</p>
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	<p>Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.</p> <p>Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.</p> <p>A por belélegzése tilos.</p> <p>Védőkesztyű használata kötelező.</p> <p>Expozíció vagy annak gyanúja esetén:Orvosi ellátást kell kérni.</p> <p>Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.</p>

Elzárva tárolandó.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően..

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Házi egerek és/vagy patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - beltéri

Terméktípus	14. terméktípus - Rágcsálóirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)
Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt	Nem releváns rágcsálóirtók esetén
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Mus musculus-házi egér-fiatal és ivarérett egyedek Rattus norvegicus-vándorpatkány-fiatal és ivarérett egyedek
Felhasználási terület	Beltéri beltéri
Az alkalmazás módja(i)	Csalétek alkalmazása - Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.
A felhasználás mértéke és gyakorisága	Egerek: 5-20g csalétek etetőállomásonként. Patkányok: 10-60g csalétek etetőállomásonként. - - - Egerek ellen: 5 - 20 g csalétek/etetőhely. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 2 méternek (nagy mértékű fertőzöttség esetén) vagy 5 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) kell lennie. Patkányok ellen: 10 - 60 g csalétek/etetőhely. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek (nagy mértékű fertőzöttség esetén) vagy 10 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) kell lennie. Pulzáló / ritmusos kihelyezéskor: <ul style="list-style-type: none">Egerek ellen: 5 - 20 g csalétek/etetőhely. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 2 méternek (nagy mértékű fertőzöttség esetén) vagy 5 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) kell lennie.Patkányok ellen: 10 - 60 g csalétek/etetőhely. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek (nagy mértékű fertőzöttség esetén) vagy 10 méternek (kis mértékű fertőzöttség esetén) kell lennie.
Felhasználói kör	Szakképzett felhasználó
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	

- Minimális csomagolási méret: 2,5kg.
- Többretegű papírzsákban PE nedvességzáró réteggel vagy külön PE belső zsákkal, vagy szőtt PP zsákban belső PE réteggel, vagy PP zsákban belső PE réteg nélkül. Kiszerezési méretek: 2,5kg; 3 g; 3,5kg; 4kg; 4,5kg; 5kg; 10kg; 20kg.
- 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100g vagy 200g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok: PE/PP csomagolásban (dobozok, vödrök vagy tasakok), PE bélésű kartondobozban, farostlemez karton/karton dobozba helyezve. Kiszerezési méretek: 2,5kg, 3kg, 3,5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg.
- Ömlesztett termék PE/PP csomagolásban (dobozok, vödrök, tasakok), műanyag (PE) béléssel ellátott kartondobozba helyezve. Kiszerezési méretek: 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg.
- Tálcán kiszerezve: granulátumot tartalmazó tálcák 20g-ig (patkányok és egerek) és 60g-ig (csak patkányok) hőhegesztett fedéllel, több tálca közös külső karton csomagolásban. Csomagolás méretek: 10g granulátum/tálca – 250 db tálca
15g granulátum/tálca – 250 db tálca
20g granulátum/tálca – 120 db tálca
25g granulátum/tálca – 120, 144 db tálca
30g granulátum/tálca – 96, 120, 144 db tálca
40g granulátum/tálca – 72, 96, 120, 144 db tálca
50g granulátum/tálca – 60, 72, 96, 120, 144 db tálca
60g granulátum/tálca – 48, 60, 72, 96, 120 db tálca
- Műanyag szerelvényben (egyszer használható vagy újratölthető egér vagy patkány csalétekállomásban) granulátumot tartalmazó tálcák a csalétekállomásba helyezve 20g-ig (patkányok és egerek) és 60g-ig (csak patkányok), hőhegesztett fedéllel. A csalétekállomások (1, 2 vagy 4 db) kartoncsomagolásba vagy műanyag bliszter csomagolásba helyezve. Több csalétekállomás közös külső karton csomagolásban. Csomagolás méretek: 10g - 250 db csalétekállomás
15g - 250 db csalétekállomás
20g – 120 db csalétekállomás
25g – 120, 144 db csalétekállomás
30g – 96, 120, 144 db csalétekállomás
40g – 72, 96, 120, 144 db csalétekállomás
50g – 60, 72, 96, 120, 144 db csalétekállomás
60g – 48, 60, 72, 96, 120 db csalétekállomás
80g – 32, 48, 60, 72, 96 db csalétekállomás
90g – 32, 48, 60, 72, 96 db csalétekállomás
100g – 32, 48, 60, 72, 96 db csalétekállomás
120g – 24, 32, 48, 60, 72 db csalétekállomás
200g – 16, 24, 32, 48, 60 db csalétekállomás
240g – 16, 24, 32, 48, 60 db csalétekállomás

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

A kezelési időszak után távolítsuk el a megmaradó terméket.

Ha a csalétket pulzáló/ritmusos kihelyezéssel használja:

- az első kihelyezést követően 3 nappal pótolja először az elfogyasztott csalétket. Ezután legalább hetente egyszer ellenőrizze a kihelyezett csalétket.

- kiszóródott irtószert takarítsa fel, az elhullott rágcsálókat pedig gyűjtse össze.

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének használóit) a rágcsálóiirtásról.
Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.
- A terméket ne használja tartósan csalétekként a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsáló aktivitás kimutatására.

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőállomásokat vízelvezető rendszerek közelében helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

4.2 A felhasználás leírása

Felhasználás 2 - Házi egerek és/vagy patkányok - szakképzett foglalkozásszerű felhasználók - kültéren épületek körül

Terméktípus

14. terméktípus - Rágcsálóiirtó szerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Nem releváns rágcsálóiirtók esetén

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Mus musculus-házi egér-fiatal és ivarérett egyedek
Rattus norvegicus-vándorpatkány-fiatal és ivarérett egyedek

Felhasználási terület

Kültéri
Kültéren épületek körül

Az alkalmazás módja(i)

Csalétek alkalmazása -
Zárt, illetéktelen felnyitás ellen védett csalétekállomásban alkalmazandó felhasználásra kész csalétek.

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Egerek: 5-20g csalétek etetőállomásonként. Patkányok: 10-60g csalétek etetőállomásonként. - - -

Egerek irtásakor:

- kismértékű ártalom esetén: 5 méterenként 5-20g csalétek
- nagymértékű ártalom esetén: 2 méterenként 5-20g csalétek

Patkányok irtásakor:

- kismértékű ártalom esetén: 10 méterenként 10-60g csalétek
- nagymértékű ártalom esetén: 5 méterenként 10-60g csalétek

Pulzáló / ritmusos kihelyezéskor:

- Egerek irtásakor: 5-20g csalétek/etetőhely. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 2 méternek kell lennie. Kismértékű ártalom esetén: 5 méterenként 5-20g csalétek; nagymértékű ártalom esetén: 2 méterenként 5-20g csalétek.
- Patkányok ellen: 10-60g csalétek/etetőhely. Ha több etetőállomásra van szükség, az etetőállomások közötti távolságnak legalább 5 méternek kell lennie. Kismértékű ártalom esetén: 10 méterenként 10-60g csalétek; nagymértékű ártalom esetén: 5 méterenként 10-60g csalétek.

Felhasználói kör

Szakképzett felhasználó

Csomagolási méretek és csomagolóanyagok

- Minimális csomagolási méret: 2,5kg.

- Többrétegű papírzsákban PE nedvességzáró réteggel vagy külön PE belső zsákkal, vagy szőtt PP zsákban belső PE réteggel, vagy PP zsákban belső PE réteg nélkül. Kiszerezési méretek: 2,5kg; 3 g; 3,5kg; 4kg; 4,5kg; 5kg; 10kg; 20kg.

- 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100g vagy 200g papír/PE vagy AL/PE vagy papír/Al/PE tasakok: PE/PP csomagolásban (dobozok, vödrök vagy tasakok), PE bélésű kartondobozban, farostlemez karton/karton dobozba helyezve. Kiszerezési méretek: 2,5kg, 3kg, 3,5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg.

- Ömlesztett termék PE/PP csomagolásban (dobozok, vödrök, tasakok), műanyag (PE) béléssel ellátott kartondobozba helyezve. Kiszerezési méretek: 2,5kg, 3kg, 3,5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg, 20kg.

- Tálcán kiszerezve: granulátumot tartalmazó tálcák 20g-ig (patkányok és egerek) és 60g-ig (csak patkányok) hőhegesztett fedéllel, több tálca közös külső karton csomagolásban. Csomagolás méretek: 10g granulátum/tálca – 250 db tálca

	15g granulátum/tálca – 250
db tálca	
	20g granulátum/tálca – 120
db tálca	
	25g granulátum/tálca – 120,
144 db tálca	
	30g granulátum/tálca – 96,
120, 144 db tálca	
	40g granulátum/tálca – 72,
96, 120, 144 db tálca	
	50g granulátum/tálca – 60,
72, 96, 120, 144 db tálca	
	60g granulátum/tálca – 48,
60, 72, 96, 120 db tálca	

- Műanyag szerelvényben (egyszer használható vagy újratölthető egér vagy patkány csalétekállomásban) granulátumot tartalmazó tálcák a csalétekállomásba helyezve 20g-ig (patkányok és egerek) és 60g-ig (csak patkányok), hőhegesztett fedéllel. A csalétekállomások (1, 2 vagy 4 db) kartoncsomagolásba vagy műanyag bliszter csomagolásba helyezve. Több csalétekállomás közös külső karton csomagolásban.
Csomagolás méretek: 10g - 250 db csalétekállomás
15g - 250 db csalétekállomás
20g - 120 db csalétekállomás
25g - 120, 144 db csalétekállomás
30g - 96, 120, 144 db csalétekállomás
40g - 72, 96, 120, 144 db csalétekállomás
50g - 60, 72, 96, 120, 144 db csalétekállomás
60g - 48, 60, 72, 96, 120 db csalétekállomás
80g - 32, 48, 60, 72, 96 db csalétekállomás
90g - 32, 48, 60, 72, 96 db csalétekállomás
100g - 32, 48, 60, 72, 96 db csalétekállomás
120g - 24, 32, 48, 60, 72 db csalétekállomás
200g - 16, 24, 32, 48, 60 db csalétekállomás
240g - 16, 24, 32, 48, 60 db csalétekállomás

4.2.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

- Védje a csalétket az időjárás viszontagságaitól. Az etetőállomásokat csapadéktól és talajvíztől védett helyre helyezze ki.
- Cseréljen ki az etetőhelyen minden olyan csalétket, amelyet a víz megromgált vagy amely elszennyeződött.
- A kezelési időszak végén távolítsa el a megmaradó terméket.
- A csalétket úgy kell kihelyezni, hogy gyermekek és nem célszervezet állatok ne férhessenek hozzá.
- Ha a csalétket pulzáló/ritmusos kihelyezéssel használja, úgy az első kihelyezést követően 3 nappal pótolja először az elfogyasztott csalétket. Ezután legalább hetente egyszer ellenőrizze a kihelyezett csalétket. A kiszóródott irtószert takarítsa fel, az elhullott rágcsálókat pedig gyűjtse össze.

4.2.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat (például a kezelt terület és környékének használóit) a rágcsálóirtásról.
- Vegye fontolóra a megelőző védelmi intézkedéseket (lyukak betömése, a rágcsálók táplálékforrásának eltávolítása, amennyire lehetséges) annak érdekében, hogy a rágcsálók a termékből többet fogyasszanak, és később kisebb valószínűséggel telepedjenek meg újból a területen.
- A terméket ne használja tartósan csalétekként a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsáló aktivitás kimutatására.
- **Ne alkalmazza a terméket közvetlenül üregekben.**

4.2.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

Ha az etetőhelyeket felszíni vizek (például folyók, tavak, vizesárok, gátak, öntözőcsatornák) vagy vízelvezető rendszerek közelébe helyezi el, biztosítsa, hogy a csalétket ne érje víz.

4.2.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.2.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

- Használata előtt olvassa el és kövesse a termékinformációkat, valamint a termékhez mellékelt vagy az értékesítéskor átadott összes információt.
- Végezzen előzetes felmérést a csalétek alkalmazásáról a fertőzött területen, valamint helyszíni vizsgálatot a rágcsáló fajok, aktivitási területük, valamint a fertőzöttség legvalószínűbb okának és mértékének meghatározása érdekében.
- Távolítsa el a rágcsálók számára könnyen elérhető élelmiszert (például kiömlött gabonát vagy élelmiszer-hulladékot). Ettől eltekintve, ne tisztítsa meg a fertőzött területet a kezelés előtt közvetlenül, mivel ez csak megzavarja a rágcsáló populációt, és nehezebbé teszi a csalétek elfogadását.
- A termék kizárólag integrált kártevőirtási rendszer (IPM) keretében használható, beleértve többek között a higiénés intézkedéseket és – ha lehetséges – a fizikai védekezési módszereket.
- A terméket azoknak a helyeknek a közvetlen közelében kell elhelyezni, ahol korábban megfigyelték a rágcsálói aktivitást (például vonulási útvonalak, fészkek, takarmányraktár, nyílások, üregek stb.).
- Ahol lehetséges, az etetőállomást a talajhoz vagy egyéb szerkezethez kell rögzíteni.
- Az etetőállomáson egyértelműen fel kell tüntetni, hogy rágcsálóirtót tartalmaz, és nem szabad mozgatni vagy felnyitni.
- A csalétket úgy kell rögzíteni, hogy ne lehessen elvinni az etetőállomásról.
- A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célzott állatok számára nem hozzáférhető helyen helyezze el.
- A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól, valamint ezekkel érintkezésbe kerülő edényektől vagy felületektől távol helyezze el.
- Viseljen vegyszerálló védőkesztyűt a termék alkalmazása során.
- A termék alkalmazása közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termék alkalmazása után mosson kezet, és mossa meg a termékkel közvetlenül érintkező bőrfelületet.
- A kezelt területek ellenőrzésének gyakoriságát a kezelést végző személy határozza meg a kezelés kezdetén végzett felmérés alapján. E gyakoriságnak összhangban kell állnia a vonatkozó helyes gyakorlati kódex által adott ajánlásokkal.
- Ha a csalétek felvétele a fertőzöttség nyilvánvaló méretéhez képest alacsony, vegye fontolóra az etetőállomás áthelyezését másik helyre, valamint másik csalétek formuláció választását.
- Ha a 35 napos kezelési időszak után a csalétket továbbra is fogyasztják, és nem csökken a rágcsálói aktivitás, meg kell állapítani a valószínű okot. Amennyiben minden más okot kizárt, valószínű, hogy vannak rezisztens rágcsálók, így vegye fontolóra nem véralvadésgátló rágcsálóirtó, amennyiben rendelkezésre áll, vagy erősebb véralvadésgátló rágcsálóirtó használatát. Alternatív védekezési intézkedésként vegye fontolóra csapdák alkalmazását.
- Kiszerezésre vonatkozó külön előírás:
 - tasakos kiszerezések: A tasakokat ne nyissa fel, felnyitás nélkül kell kihelyezni.
 - ömlesztett granulátum: A csalétket egy arra alkalmas adagoló eszköz segítségével mérje ki és helyezze a csalétekállomásba. A kiszóródott irtószer összetakarításakor kerülje a porképződést, használjon pl. nedves törülőkendőt.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

- Ahol lehetséges, a kezelés előtt tájékoztassa az esetlegesen közelben tartózkodókat a rágcsálóirtásról.
- A 10 kg-nál nagyobb ömlesztett kiszereléseken: A termék átöntésekor viseljen megfelelő légzésvédő maszkot (legalább EN149 FFP2 minőségtanúsítvánnyal rendelkező vagy ezzel egyenértékű védelmet nyújtó egyszer használatos légzésvédőt
- Ne használja olyan területen, ahol gyanítható, hogy a hatóanyag elleni rezisztencia áll fenn.
- A termék 35 nap után kizárólag a fertőzőtség állapotának és a kezelés hatékonyságának értékelését követően használható tovább.
- A terméket ne használja tartósan csalétekként a rágcsálók elszaporodásának megelőzésére vagy rágcsáló aktivitás kimutatására.
- A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ne használjon felváltva hasonló vagy kisebb hatékonyságú véralvadásgátlókat! Váltott alkalmazáshoz más hatásmechanizmusú rágcsálóirtószert – ha elérhető –, vagy nagyobb hatékonyságú véralvadásgátló hatóanyagot használjon.
- Az eltakart és védett rágcsálóirtó pontokon használt csapdákat vagy szerszámokat két alkalmazás között ne mossa ki vízzel.
- A szakképzett foglalkozástervező felhasználók az elhullott rágcsálók tetemeinek veszélyes hulladékként történő megsemmisítéséről a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek gondoskodni.
- A másodlagos mérgezés kockázatának csökkentése érdekében gyakran, a helyes kártevőirtási gyakorlat ajánlásaival összhangban távolítsa el a kezelés alatt elpusztult rágcsálókat.
- megjegyzés: A termékinformáció (azaz a címke és/vagy tájékoztató) egyértelműen figyelmeztet arra, hogy a termékhez kizárólag szakképzett foglalkozástervező felhasználók juthatnak hozzá, akik a vonatkozó képzési követelményeknek megfelelő tanúsítással rendelkeznek (pl. „kizárólag szakképzett foglalkozástervező felhasználóknak”).

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

A termék véralvadásgátló anyagot tartalmaz. Lenyelés esetén — adott esetben késleltetve jelentkező — tünetek közé tartozhat például az orrvérzés és a fogínyvérzés. Súlyos esetekben bőrbevérzés, véres vizelet vagy széklet is előfordulhat.

Ellenszer: Kizárólag orvos, illetve állatorvos által beadott K1-vitamin.

Továbbá:

- **Bőrrel való érintkezés esetén:** mossa le a bőrt vízzel, majd vízzel és szappannal.
- **Szembe kerülés esetén:** ha a sérült kontaktlencsét visel, távolítsa el, majd néhány percen át öblögesse a szemet a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.
- **Szájba kerülés esetén:** gondosan öblítse ki a száját vízzel. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon száján át. Tilos hánytatni! Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát vagy címkéjét. Ha háziállat nyeli le a terméket, forduljon állatorvoshoz.

Az etetőállomások címkéjén az alábbi információkat kell feltüntetni: „tilos elmozdítani vagy kinyitni”; „rágcsálóirtót tartalmaz”; „termék neve és az engedély száma”; „hatóanyag(ok)” és „baleset esetén forduljon toxikológiai központhoz. (Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat telefonszáma: 06 80 20 11 99)

Veszélyes a vadon élő állatokra.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

Az eredeti céljára fel nem használható, hulladékká vált irtószert és etetőállomásokat veszélyes hulladékként kell kezelni és veszélyes hulladék átvévi helyre – pl. hulladékudvar – kell leadni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolandó. Az irtószert tartalmazó csomagolás zárva és a közvetlen napfénytől védve tárolandó. Gyermek, madarak, háziállatok és használókat számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

Csak az eredeti csomagolásában tárolja.

Szavatossági idő: 2 évig

6. Egyéb információk

A késleltetett hatásmechanizmus miatt a véralvadásgátló rágcsálóirtó a csalétek elfogyasztása után 4-10 nappal váltja ki hatását. A rágcsálók betegséget hordozhatnak. Eltávolításuk során az elpusztult rágcsálókat ne érintse meg pusztán kézzel, használjon kesztyűt vagy egyéb eszközt, például fogót.

A termék keserű anyagot és festékanyagot tartalmaz.

A címkéfelirat tartalmazza:

Prokum Pro rágcsálóirtó granulátum

Hatóanyaga: 0,005% brodifakum

II. forgalmi kategóriájú irtószer**Engedélytulajdonos:** PelGar International Limited (Alton, Egyesült Királyság)**EMMI engedélyszám:** *HU-2015-MA-14-00140-0000*

valamint, a jelen dokumentum alábbi pontjai: 2.2., 3.1., 4.1-4.2 (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6. megfelelő részei.

A műanyag rágcsálóirtó dobozokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Prokum Pro rágcsálóirtó granulátum**Hatóanyaga:** 0,005% brodifakum**Ellenszere:** K1-vitamin**Engedélyes:** PelGar International Limited (Alton, Egyesült Királyság)**EMMI engedélyszám:** *HU-2015-MA-14-00140-0000*

Továbbá a rágcsálóirtószer tartalmazó filterpapír és műanyag tasakokon feltüntetendő az alábbi szöveg:

Prokum Pro rágcsálóirtó granulátum**Hatóanyaga:** 0,005% brodifakum**Ellenszere:** K1-vitamin