

Engedélyezési lap

- 1. Az irtószer neve:** Aptaor™ L légylárvairtó granulátum
- 2. Gyártja:** Shirm AG., Division Sifokan, Baar-Ebenhausen, Németország
- 3. Forgalomba hozza:** DeLaval Kft. 2040 Budaörs, Templom tér 4.
- 4. Engedély száma:** JÜ-1103/2011.
- 5. Minősítése:** III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer
- 6. Hatóanyaga:** 2 % ciromazin

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:

Sárgásfehér színű, 1-4 mm nagyságú, vízben oldható granulátum. Hatóanyaga a rovarnövekedést szabályozók közé tartozó ciromazin, a légylárvák fejlődésében morfológiai elváltozásokat okoz, és ezáltal megakadályozza az imágók normális kifejlődését.

8. Csomagolás:

- 5 kg töltőtömeggel többretegű műanyag zsákban,
- 20 kg töltőtömeggel kartondobozban kerül forgalomba.

9. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, különleges tárolási körülményeket nem igényel.
A gyártástól számítva 5 évig használható fel.
(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!)

10. Felhasználhatóság kártevők szerint:

Állati trágyában fejlődő légylárvák irtására használható fel.

11. Használati utasítás:

Az Aptaor™ L légylárvairtó granulátum a légytenyésztő helyekre háromféle módon juttatható ki (10 m² felület kezelésére szükséges mennyiség):

- *kiszórással:* 250 g Aptaor™ L. A készítményt nedves vagy vizes trágyára egyenletesen szórjuk ki.
- *permetezéssel:* 250 g Aptaor™ L + 2,5 liter víz. A kiszámított mennyiségű készítményt a megfelelő vízmennyiséggel keverjük össze, majd a munkaoldatot peremezővel juttassuk a légytenyésztő helyekre.
- *öntözéssel:* 250 g Aptaor™ L + 7,5 liter víz. A kiszámított mennyiségű készítményt a megfelelő vízmennyiséggel keverjük össze, majd a munkaoldatot öntöző kannával juttassuk a légytenyésztő helyekre.

Alkalmazás előtt gondosan mérjük fel az összes légytenyésztő helyet, és azokat egyszerre kezeljük. A kezelésekre az istállózási rendszertől és az időjárási függően 2-3 hét – több hónap közötti gyakorisággal kerülhet sor.

Alkalmazása borjú nevelőkben:

Mélyalomban: az etető és itató berendezések alatt és a falak mentén kb. 50 cm széles csíkokat alakítsunk ki, továbbá kezeljük azokat az alomrészeket, amiket nem tapostak keményre az állatok, és ott, ahol az alom átnedvesedett.

Külső borjúkarámokban: kezeljük az egész felületet, majd ismétljük meg a kezelést minden kialakulás után vagy amikor az alomban légylárvák jelennek meg.

A permetezéssel vagy öntözéssel történő kezelést 3 nappal a kialakulást követően alkalmazzuk, majd azt ismétljük meg minden takarítás után vagy abban az esetben, ha a trágyában légylárvák jelennek meg.

Borjak rácspadozaton: a kialakulás után a trágya akna kiszórásos kezelését azonnal végezzük el, majd ismétljük meg a következő kialakuláskor vagy abban az esetben, ha a trágyában légylárvák jelennek meg.

Alkalmazása sertésólban:

Egyszeri ürítéssel-telepítéssel rendszerben: a takarítás után azonnal vagy a malacok betelepítése előtt kiszórással történjen a kezelés.

Mélyalmos rendszerben: a trágya eltávolítása kb. 3 nappal után a kezelést permetezéssel vagy öntözéssel végezzük, majd azt ismétljük meg minden kitrágyázás után vagy abban az esetben, ha a trágyában légylárvák jelennek meg. Fordítsunk kiemelt figyelmet a trágyafelület egészének, illetve az etetők és itatók körüli nedves felületek kezelésére.

Alkalmazása baromfi istállóban:

A trágya egész felületét 1 héttel a trágya eltávolítása után kezeljük, majd azt ismétljük meg minden kitrágyázás után vagy abban az esetben, ha a trágyában légylárvák jelennek meg.

Alkalmazása egyéb állattartó helyeken:

A kezeléseket 1-3 nappal a trágya felhalmozódását követően 1-3 nappal végezzük el, majd azt 2 hét múlva ismétljük meg.

Mivel a készítmény csak a légylárvákra hat, ezért a kifejlett legyek elpusztítása érdekében az imágókat az AptaorTM A légyirtó kenőanyag alkalmazásával pusztítsuk el.

12. Figyelmeztetés:

Élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen tárolandó! Óvakodjunk attól, hogy a készítmény az itatókba, vagy a vályúkba kerüljön! Munkavégzés után meleg, szappanos vízzel kezét kell mosni. Ügyeljünk arra, hogy a permetet ne lélegezzük be, és ne kerüljön a szembe. Lenyeléskor azonnal forduljunk orvoshoz!

13. Címkefelirat:

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12.pontokat.

14. OEK szakvélemény száma: 7711/122/2011. DDO