

## Engedélyezési lap

- 1. Az irtószer neve:** Biopren<sup>®</sup> 4 GR légylárvá-irtó granulátum
- 2. Gyártja:** Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6.
- 3. Forgalomba hozza:** Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Bp. Szállás u. 6.
- 4. Engedély száma:** JKF/12790-3/2015.

**5. Terméktípus és minősítés:**

**5.1. Biocid terméktípus:** 18. terméktípus

**5.2. Termék minősítése:** III. forgalmazási kategóriájú irtószer

**6. Hatóanyaga:** 0,4% S-metoprén

**7. Fizikai, kémiai és hatástani tulajdonságok:**

A 0,4-1,6 mm szemcseméretű, kék színű homokgranulátumra felvitt hatóanyag, amely juvenoid hatása révén, a légylárvák imágóvá történő fejlődését gátolja. A készítmény víz hatására, lassan, folyamatosan bocsátja ki a hatóanyagot.

**8. Csomagolás:**

- 200 g, 500 g és 1 kg töltési tömeggel műanyag flakonban,
- 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 12,5 kg, 15 kg, 20 kg és 25 kg töltési tömeggel műanyag vödörben,
- 200 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg és 2 kg töltési tömeggel műanyag zsákkal bélelt kartondobozban,
- 10 kg, 15 kg, 20 kg és 25 kg töltési tömeggel papírzsákban
- 10 kg, 15 kg, 20 kg és 25 kg töltési tömeggel műanyag zsákban kerül forgalomba.

**9. Eltarthatóság és tárolás:**

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett, 35 °C alatti helyen tárolva a gyártástól számítva 3 évig használható fel.

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!)

**10. Felhasználhatóság kártevők szerint**

A trágyába juttatva a házi légy lárvák fejlődésének és a bábok imágóvá történő átalakulásának meggátlására alkalmas.

**11. Használati utasítás:**

A készítmény zárt sertés-, szarvasmarha és baromfitelepeken, valamint ló-, kecske-, juhállókban és egyéb, haszonállattartó helyeken használható fel, a trágyában tenyésző légylárvák imágókká történő átalakulásának gátlására.

A rácspadló, fémrácsos padozat, mélyalmos rendszer, illetve a ketrec alatt összegyűlt trágyát kezeljük. A granulátumot ne szórjuk közvetlenül az etető- és itatóhelyek mellé, vagy olyan helyre, ahol az állatok fogyaszthatnak a szerből.

A készítmény használata előtt a tojásokat gyűjtsük össze, valamint távolítsuk el a készítménnyel esetlegesen érintkező itatóvizet és tejet. Kerüljük el, hogy a haszonállatok a szerrel érintkezzenek. Amennyiben ez nem oldható meg, a kezelés idejére a haszonállatokat távolítsuk el.

A granulátum alkalmazási dózisa 25-30 g/m<sup>2</sup>, ez a dózis 10 cm vastagságú trágyarétegre vonatkozik. A kezeléshez szükséges granulátum mennyiséget a csomagolásban található pohár segítségével mérjük ki, majd a kimért mennyiséget a pohár alkalmazásával egyenletes rétegben szórjuk ki a trágya felületére az alábbiak szerint.

**Sertéstelepen, szarvasmarha istállóban:**

-*Rácsvadló, fémrácsos padozat esetén:* Az új állatállomány betelepítését követő 3. napon végezzük el a kezelést, majd azt követően minden újonnan keletkezett 10 cm-es trágyaréteget kezeljük le. Minden trágyaelszállítás után végezzük el a megmaradt trágya felületének egyenletes kezelését.

**Baromfitelepen:**

-*Ketreces tartás esetén:* A granulátumot a ketrecek alatt összegyűlt trágyára szórjuk ki.

-*Mélyalmos tartás esetén:* Az új állomány fogadása előtt kezeljük a behelyezett almot.

**Hatástartósság:** a kijuttatott granulátum 12 héten keresztül fejti ki fejlődésgátló hatását.

**12. Figyelmeztetés**

Kizárólag légylárvák irtására és csak a használati utasítás szerint alkalmazható!

A készítmény használatakor a 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet 8. számú mellékletének vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani.

Munkavégzéskor zárt védőruházat, védőkesztyű és védőszemüveg viselése kötelező.

Élelemtől, takarmánytól távol, száraz, zárt helyen, eredeti csomagolásában úgy kell tárolni, hogy illetéktelenek (gyermekek és haszonállatok) ne férhessenek hozzá.

Munka közben étkezni, dohányozni tilos! Kerüljük a készítmény bőrrel való érintkezését és a szembejutást. Szembejutás esetén bő vízzel legalább 15 percig mossuk a szemet, majd forduljunk orvoshoz. Alkalmazása után meleg, szappanos vízzel alaposan kezet kell mosni.

Mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Ezen túlmenően a készítmény:

- természetes állóvizek és vízfolyások, valamint ezekkel összeköttetésben levő vízgyülemek partszegélyétől számított 50 méteres távolságon belül nem használható fel;
- védett természeti területeken nem alkalmazható.

Tilos a szert, annak maradékát vagy kiürült csomagolóanyagát élővizekbe (folyó, tó stb.) juttatni!

Épületen kívül tárolt trágyát csak abban az esetben kezeljük, ha az olyan trágyatárolóban került elhelyezésre, amely szivárgásmentes, szigetelt, illetve megfelel a biztonságos trágyatárolás egyéb követelményeinek. Az épületen kívül tárolt trágya kezelésekor a szert 25-30 g/m<sup>2</sup> dózisban használjuk.

A trágya földeken való szétterítése, feldolgozása esetén, két hónappal azt megelőzően, már ne kezeljük a trágyát a lárvairtó szerrel.

Tartsuk be a trágya tárolására és felhasználására vonatkozó hatályos (59/2008. (IV.29.))

FVM rendelet előírásait és a vonatkozó egyéb helyi előírásokat.

Az anyag maradékát veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

**13. Címkefelirat:**

az Engedélyezési lap 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12. pontjait kell feltüntetni.

**14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3036-1/2015**