

Engedélyezési lap

- 1. Az irtószer neve:** HokoEx légylárvá-irtó granulátum
- 2. Gyártja:** HOKO sarl. (Nogent-sur-Marne, Franciaország)
- 3. Forgalomba hozza:** Déli-Farm Kft. (6791 Szeged-Kiskundorozsma Kettőshatári út 6.)

4. Engedély száma: OTH 1420-3/2008.

5. Minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer

6. Hatóanyaga: 2 % ciromazin

7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:

Fehér színű, 1-4 mm nagyságú, vízben oldható granulátum. Hatóanyaga a rovarnövekedést szabályozók közé tartozó ciromazin, a légylárvák fejlődésében morfológiai elváltozásokat okoz, és ezáltal megakadályozza az imágók normális kifejlődését.

8. Csomagolás:

- 250 gramm és 1 kg töltőtömeggel műanyag dobozban,
- 5 kg töltőtömeggel többretegű műanyag zsákban,
- 70 kg töltőtömeggel polietilén zsákban, fémhordóban kerül forgalomba.

9. Eltarthatóság és tárolás:

Eredeti, zárt csomagolásban, fénytől védett, száraz, hűvös helyen, tárolva, a gyártástól számítva 5 évig használható fel.

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!)

10. Felhasználhatóság kártevők szerint:

Állati trágyában fejlődő légylárvák irtására használható fel.

11. Használati utasítás:

A HokoEx légylárvá-irtó granulátum a légytenyésztő helyekre háromféle módon juttatható ki (10 m² felület kezelésére szükséges mennyiség):

- *kiszórással:* 250 g HokoEx-et nedves vagy vizes trágyára egyenletesen szórjuk ki.
- *permetezéssel:* 250 g HokoEx-et (a trágya jellegétől függően) oldjunk fel 1 - 4 liter vízben, majd a munkaoldatot peremezővel juttassuk a légytenyésztő helyekre.
- *öntözéssel:* 250 g HokoEx-et oldjunk fel 10 liter vízben, majd a munkaoldatot öntöző kannával juttassuk a légytenyésztő helyekre.

Alkalmazás előtt gondosan mérjük fel az összes légytenyésztő helyet, és azokat egyszerre kezeljük. A kezelésekre az istállózási rendszertől és az időjárási függően 2-6 hetente kerülhet sor.

Alkalmazása:

• **Marhaistállóban:**

A mélyalmos részeket a falak mentén, a szerelvények mellett és alatt öntözőkannával vagy háton hordható peremezővel kell kezelni. Folyékony trágya esetén kiszórni is lehet. Az első kezelést kb. 1-3 nappal a ganajozás után kell elvégezni. Rácspadozatos marhaistállóban a teljes padlófelületeket HokoEx-el egyenletesen be kell szórni.

- **Sertésistállóban:**

Amennyiben a teljes felület rácspadozatos, akkor a teljes felületet, ha csak a felület egy része rácspadozatos, akkor a rácsos felületeket és a fekvőhelyek széleit kell kezelni. A kezelés kiszórással, öntözéssel vagy permetezéssel történhet. Legjobb a kezelést az állatok istállóba vitele előtt, illetve ganajozás vagy a trágyalé leeresztése után elvégezni.

- **Tyúkólban:**

Nedves vagy folyékony ürülék/trágya esetén szárazon kell a szert kiszórni, száraz trágya esetén a kezelést öntözőkannával vagy háton hordható permetezővel kell elvégezni. A trágyafelületet először kb. egy hét múlva (az ürülék 10 cm vastagát megelőzősen) kell kezelni.

12. Figyelmeztetés:

Lezárva és gyermekek számára nem hozzáférhető módon, élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól elválasztva kell tárolni. Munka közben étkezni, dohányozni és inni tilos! Megfelelő védőkesztyű viselése kötelező. Kerüljük el a szer bőrre és szembe jutását. Bőrre vagy szembe kerülés esetén bő a szert bő vízzel azonnal le kell mosni, illetve szemöblítést kell végezni. Baleset vagy rosszullet esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Felhívjuk a figyelmet a kezelés alatt (különösen boxos istállóban) a helyszínen levő állatok következtében fennálló balesetveszélyre. A HokoEx alkalmazása során kerülje a szer takarmányba, takarmányozó és itató berendezésbe, valamint fejőgépbe kerülését.

13. Címkefelirat:

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12.pontokat.

14. OEK szakvélemény száma: 7711/1/2008. DDO