

## Engedélyezési lap

**1. Az irtószer neve:** Maggots GR légylárvá-irtó granulátum

**2. Gyártja:** Belgagri S.A. (Engis, Belgium)

**3. Forgalmába hozza:** Hat-Agro Higiénia Kft., 9027 Győr, Tibormajori út 1.

**4. Engedély száma:** JKF/7139-3/2015.

**5. Terméktípus és minősítés:**

**5.1. Biocid terméktípus:** 18. terméktípus

**5.2. Termék minősítése:** III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer

**6. Hatóanyaga:** 2% ciromazin

**7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:**

Fehér színű, vízben oldható granulátum. Hatóanyaga rovarnövekedést gátló hatású.

**8. Csomagolás:**

- 1 kg töltőtömeeggel kartonpapír hengerben,
- 2, 5 és 10 kg töltőtömeeggel műanyag vödörben, valamint
- 20 és 25 kg töltési tömeeggel műanyag- vagy papírzsákban kerül forgalomba.

**9. Eltarthatóság és tárolás:**

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!)

**10. Felhasználhatóság kártevők szerint:**

Állati trágyában tenyésző légylárvák (pl. házi légy, szuronyos istállólégy) fejlődésének gátlására használható.

**11. Használati utasítás:**

A Maggots GR légylárvá-irtó granulátum a légytenyésztő helyekre háromféle módon juttatható ki (20 m<sup>2</sup> felület kezelésére szükséges mennyiség):

- *kiszórással:* 500 g Maggots GR-t szórjunk ki egyenletesen a nedves vagy vizes trágyára (hígtrágyára).
- *permetezéssel:* 500 g Maggots GR-t oldjunk fel 5 liter vízben, majd a munkaoldatot peremezővel juttassuk ki a légytenyésztő helyekre.
- *öntözéssel:* 500 g Maggots GR-t oldjunk fel 15 liter vízben, majd a munkaoldatot öntözőkannával juttassuk ki a légytenyésztő helyekre.

Alkalmazás előtt gondosan mérjük fel az összes légytenyésztő helyet, és azokat egyszerre kezeljük. A készítmény használata előtt a tojásokat gyűjtsük össze, valamint távolítsuk el a készítménnyel esetlegesen érintkező itatóvizet és tejet.

A kezelések gyakorisága az istállózási rendszertől és az időjárási viszonyoktól függően 2-3 hét és néhány hónap között változhat. Általában 6 hetente célszerű megismételni a kezelést.

Az utolsó kijuttatást úgy időzítsük, hogy a trágya felhasználása (termőföldre történő kiszórása) előtt legalább 21 nap teljen el.

A maximálisan alkalmazható kezelésszám:

- szarvasmarha trágya/hígtrágya esetén: 6 kezelés/év,
- sertés trágya/hígtrágya esetén: 3 kezelés/év,
- baromfi trágya/hígtrágya kezelésekor: 50 gramm készítmény/m<sup>2</sup> trágya/év.

A Maggots GR légylárvá-irtó granulátum a felhasználási hely, illetve kijuttatási mód függvényében az alábbiak szerint alkalmazható:

**1) Szarvasmarhatartó telepen:**

- *Mélyalom esetén:* fordítsunk különös gondot a szerelvények (pl. etetők, itatók) melletti és alatti területek, a takarmány-kiszóródási helyek, a falszögletek, valamint a padozatrések és repedések kezelésére (ahol a trágya felgyűlhet). Szabadtéri borjú-boxoknál kezeljük a teljes felületet. A készítményt permetezéssel vagy locsolással juttassuk ki, kb. 3 nappal a ganajozás után.
- *Ráncpadozat esetén:* közvetlenül a trágyatároló kiürítése után kezeljük a teljes padozatot.

A kezelést minden ganajozáskor, illetve légylárvák észlelése esetén ismételjük meg.

**2) Sertéstartó telepen:**

- *Egyszerre betelepítés – egyszerre kitelepítéses („all-in/all-out”) rendszer esetén:* a kezelést kiszórással végezzük el, közvetlenül a ganajozás vagy a trágyalé leeresztése után, valamint a betelepítés előtt.
- *Mélyalom esetén:* A készítményt permetezéssel vagy locsolással juttassuk ki, kb. 3 nappal a ganajozás után, majd a kezelést minden ganajozáskor, illetve légylárvák észlelése esetén ismételjük meg. Kezeljük a trágya teljes felületét, továbbá az etetők és itatók körüli átnedvesedett helyeket.
- *Ráncpadozat esetén:* közvetlenül a trágyatároló kiürítése után kezeljük a teljes padozatot. A kezelést minden ganajozáskor, illetve légylárvák észlelése esetén ismételjük meg.

**3) Baromfitartó telepen:**

- A készítményt permetezéssel vagy locsolással juttassuk ki a teljes trágyafelületre, kb. 1 héttel a ganajozás után, majd a kezelést minden ganajozáskor, illetve légylárvák észlelése esetén ismételjük meg.

**4) Egyéb állattartó telepeken:**

- A készítményt a fentiekkel megegyező módon használhatjuk juhakolban, kecskeistállóban és nyúltartó telepen is.

Mivel a készítmény kizárólag a légylárvákra hat, a kifejlett legyek elpusztítása érdekében célszerű egyidejűleg imágóirtást is végezni.

**12. Figyelmeztetés:**

Kizárólag légylárvá irtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható! A készítmény használata közben viseljünk megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt. Ügyeljünk arra, hogy a készítmény ételmiszerre, ételmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre ne kerüljön. Az állatokra közvetlenül nem juttatható! A készítmény kijuttatása során a helyiségben illetéktelen személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak. Kijuttatás előtt a víztároló medencéket, edényeket le kell takarni. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Munkavégzés után meleg, szappanos vízzel kezét kell mosni.

Méhekre veszélyes! Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Gyermekektől elzárva tartandó.

**13. Címkefelirat:**

Tartalmazza az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11. és 12. pontokat.

**14. OEK szakvélemény száma:** DD-EPID/1060-1/2015.