

## Engedélyezési lap

**1. Az irtószer neve:** Protect® hangyairtó csalétek

**2. Gyártja:** Mylva S.A. (Barcelona, Spanyolország)

**3. Forgalomba hozza:** Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., 1107 Budapest, Szállás u. 6.

**4. Engedély száma:** JKF/14090-2/2015.

**5. Terméktípus és minősítés:**

**5.1. Biocid terméktípus:** 18. terméktípus

**5.2. Termék minősítése:** III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer

**6. Hatóanyaga:** 0,01% imidakloprid + 0,08% S-metoprén

**7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok:**

Műanyag tartóban elhelyezett, szagtalan, sűrűn folyó gél, amely hatását a hangyákra gyomorméregként fejti ki.

**8. Csomagolás:**

Az 5 gramm készítményt alumínium fóliával lezárt bliszterben tartalmazó gél, műanyag csalétekállomásba helyezve, az alábbi kiszerelésekben kerül forgalomba:

– 1, 2 vagy 4 db csalétekállomás, címkefelirattal ellátott papírdobozban, illetve

– 1, 2 vagy 4 db csalétekállomás, címkefelirattal ellátott bliszter csomagolásban.

**9. Eltarthatóság és tárolás:**

Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolva, a gyártástól számítva 2 évig használható fel.

(A gyártás idejét a dobozon fel kell tüntetni!)

**10. Felhasználhatóság kártevők szerint:**

Zárt térben és a teraszon előforduló házi és kerti hangyák elpusztítására alkalmas.

**11. Használati utasítás:**

A csalétekállomást a hangyák vonulási útvonala mentén, illetve a fészkek bejáratához közel helyezük el.

A műanyag csalétekállomás aktiválásával biztosítjuk a hangyák hozzájutását a gélhez:

1. Helyezzük a műanyag dobozt vízszintes felületre.

2. A csalétekdoboz tetején található átlátszó záró korongot távolítsuk el.

3. A hangyairtó gélt tartalmazó kapszula tetejét ujjbeggyel határozottan nyomjuk be. Ennek hatására a gél a csalétekállomás aljába folyik.

4. A záró korongot pattintsuk vissza a helyére.

A csalétek kihelyezése előtt minden élelmiszert és élelmiszer-maradékot távolítsunk el, illetve zárjunk el. Nagyobb mértékű hangyaártalom kezelésekor több csalétekállomás egyidejű alkalmazása javasolt.

A csalétekből fogyasztó hangyák többsége 14 napon belül elpusztul, de a hangyamentesség eléréséhez kb. 12 hét szükséges. A Protect® hangyairtó csalétek olyan rovarnövekedést gátló hatóanyagot (S-metoprént) is tartalmaz, amelynek azonnali ölőhatása nincs, de meggátolja a királynők peterakását, illetve a lárvák fejlődésében zavart idéz elő, így a hangyaboly kihal.

Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a hangyák nem látogatják a kihelyezett csalétket, tegyük át más helyre. Szükség esetén a kezelést ismételjük meg.

A gél alkalmazásával egyidejűleg más rovarirtó szert (pl. aeroszol palackot, permetet, porozószert stb.) ne használjunk, mert azok a hangyákat a géltől elriasztják.

A véletlenül kifolyt gél a felületről mosószeres meleg vízzel távolítható el.

**12. Figyelmeztetés:**

Csak a használati utasításnak megfelelően használjuk!

A készítmény használata közben enni, inni, dohányozni tilos!

Csak olyan helyen alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok nem férhetnek hozzá.

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

Ügyeljünk arra, hogy a gél a műanyag állomásból ne csorogjon ki. A gél textíliákon és szöveteken elszíneződést okozhat.

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Használata után bő, szappanos meleg vízzel kezet kell mosni.

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét, illetve a biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve, gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen tárolandó.

**13. Címkefelirat:**

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11. és 12. pontokat.

**14. OEK szakvélemény száma: DD-EPID/3342-1/2015.**